

Троксерутин Зентива



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Троксерутин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Капсулы** твердые желатиновые, с корпусом белого цвета и крышечкой желтого цвета; содержимое капсул - гранулы желтого цвета (может иметь вид уплотненной массы в форме цилиндра).

	1 капс.
троксерутин	300 мг

Вспомогательные вещества: макрогол 6000 - 12 мг, магния стеарат - 3.12 мг.

Состав корпуса капсулы: титана диоксид - 2%, желатин - до 100%.

Состав крышечки капсулы: краситель хинолиновый желтый - 0.713%, краситель железа оксид красный - 0.005%, титана диоксид - 2%, желатин - до 100%.

10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры (6) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры (9) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Венотонизирующий, ангиопротекторный препарат, биофлавоноид. Уменьшает проницаемость и ломкость капилляров, укрепляет сосудистую стенку, улучшает микроциркуляцию, оказывает притовоотечное действие. Участвует в окислительно-восстановительных процессах, блокирует гиалуроновую кислоту клеточных оболочек. Увеличивает плотность сосудистой стенки, уменьшает экссудацию жидкой части плазмы и диapedез клеток крови, снижает воспаление в сосудистой стенке, ограничивая прилипание к ее поверхности тромбоцитов.

Применение троксерутина возможно как на начальных, так и на поздних стадиях лечения хронической венозной недостаточности в качестве одного из компонентов комплексного лечения.

Фармакокинетика

После приема внутрь препарат абсорбируется из ЖКТ, C_{max} в плазме отмечается в среднем через 2 ч после приема. Метаболизируется в печени, частично выводится в неизменном виде с мочой и желчью.

Показания к применению:

- хроническая венозная недостаточность;
- трофические нарушения при хронической венозной недостаточности (дерматиты, трофические язвы);
- варикозное расширение вен;
- поверхностный тромбофлебит, перифлебит;
- посттромботический синдром;
- посттравматический отек, гематомы;
- геморрой;
- диабетическая ангиопатия, ретинопатия.

Относится к болезням:

- [Ангина](#)
- [Ангиопатия](#)
- [Венозная недостаточность](#)
- [Гематомы](#)
- [Геморрой](#)
- [Дерматит](#)
- [Диабетическая ангиопатия](#)
- [Ретинопатия](#)
- [Тромбоз](#)
- [Тромбофлебит](#)
- [Трофические язвы](#)

Противопоказания:

- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- хронический гастрит (в фазе обострения);
- I триместр беременности;
- период лактации;
- детский и подростковый возраст до 18 лет (учитывая режим дозирования);
- повышенная чувствительность к препарату.

С осторожностью следует применять препарат при почечной недостаточности (длительное применение).

Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь во время еды. Капсулы следует проглатывать целиком.

Препарат Троксерутин Зентива следует применять по назначению врача.

Рекомендуемая доза - 1 капс. 3 раза/сут; в качестве поддерживающей терапии - 1 капс. 2 раза/сут.

Курс лечения составляет в среднем 3-4 недели; необходимость более длительного лечения определяется

индивидуально.

Побочное действие:

Возможно: головная боль, раздражение слизистой оболочки ЖКТ, аллергические реакции (в т.ч. кожные высыпания и зуд).

Передозировка:

Симптомы: возбуждение, тошнота, головная боль, приливы крови.

Лечение: промывание желудка, прием активированного угля, при необходимости - проведение симптоматической терапии.

Применение при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью следует применять Троксерутин Зентива при беременности. Возможность применения препарата при беременности определяется врачом.

Не рекомендуется применять препарат в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении усиливает действие аскорбиновой кислоты на структуру и проницаемость сосудистой стенки.

Особые указания и меры предосторожности:

При лечении поверхностного тромбоза или тромбоза глубоких вен применение препарата Троксерутин Зентива не исключает необходимость назначения противовоспалительных и противотромботических препаратов.

Использование в педиатрии

Опыт применения препарата у детей и подростков в возрасте до 15 лет отсутствует.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Применение препарата Троксерутин Зентива не оказывает влияния на двигательные и психические реакции, не препятствует управлению транспортными средствами и работе с механизмами.

При нарушениях функции почек

С осторожностью следует применять препарат при почечной недостаточности (длительное применение).

Применение в детском возрасте

Противопоказано применение препарата у детей и подростков в возрасте до 18 лет (учитывая режим дозирования).

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Trokserutin_Zentiva