

## [Троксерутин Зентива](#)



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Троксерутин](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

◇ **Капсулы** твердые желатиновые, с корпусом белого цвета и крышечкой желтого цвета; содержимое капсул - гранулят желтого цвета (может иметь вид уплотненной массы в форме цилиндра).

	<b>1 капс.</b>
троксерутин	300 мг

*Вспомогательные вещества:* макрогол 6000 - 12 мг, магния стеарат - 3.12 мг.

*Состав корпуса капсулы:* титана диоксид - 2%, желатин - до 100%.

*Состав крышечки капсулы:* краситель хинолиновый желтый - 0.713%, краситель железа оксид красный - 0.005%, титана диоксид - 2%, желатин - до 100%.

10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.

10 шт. - блистеры (6) - пачки картонные.

10 шт. - блистеры (9) - пачки картонные.

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Венотонизирующий, ангиопротекторный препарат, биофлавоноид. Уменьшает проницаемость и ломкость капилляров, укрепляет сосудистую стенку, улучшает микроциркуляцию, оказывает притовоотечное действие. Участвует в окислительно-восстановительных процессах, блокирует гиалуроновую кислоту клеточных оболочек. Увеличивает плотность сосудистой стенки, уменьшает экссудацию жидкой части плазмы и диapedез клеток крови, снижает воспаление в сосудистой стенке, ограничивая прилипание к ее поверхности тромбоцитов.

Применение троксерутина возможно как на начальных, так и на поздних стадиях лечения хронической венозной недостаточности в качестве одного из компонентов комплексного лечения.

### Фармакокинетика

После приема внутрь препарат абсорбируется из ЖКТ,  $C_{max}$  в плазме отмечается в среднем через 2 ч после приема. Метаболизируется в печени, частично выводится в неизменном виде с мочой и желчью.

### Показания к применению:

- хроническая венозная недостаточность;
- трофические нарушения при хронической венозной недостаточности (дерматиты, трофические язвы);
- варикозное расширение вен;
- поверхностный тромбофлебит, перифлебит;
- посттромботический синдром;
- посттравматический отек, гематомы;
- геморрой;
- диабетическая ангиопатия, ретинопатия.

### Относится к болезням:

- [Ангина](#)
- [Ангиопатия](#)
- [Венозная недостаточность](#)
- [Гематомы](#)
- [Геморрой](#)
- [Дерматит](#)
- [Диабетическая ангиопатия](#)
- [Ретинопатия](#)
- [Тромбоз](#)
- [Тромбофлебит](#)
- [Трофические язвы](#)

### Противопоказания:

- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- хронический гастрит (в фазе обострения);
- I триместр беременности;
- период лактации;
- детский и подростковый возраст до 18 лет (учитывая режим дозирования);
- повышенная чувствительность к препарату.

*С осторожностью* следует применять препарат при почечной недостаточности (длительное применение).

### Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь во время еды. Капсулы следует проглатывать целиком.

Препарат Троксерутин Зентива следует применять по назначению врача.

Рекомендуемая доза - 1 капс. 3 раза/сут; в качестве поддерживающей терапии - 1 капс. 2 раза/сут.

Курс лечения составляет в среднем 3-4 недели; необходимость более длительного лечения определяется

индивидуально.

## **Побочное действие:**

*Возможно:* головная боль, раздражение слизистой оболочки ЖКТ, аллергические реакции (в т.ч. кожные высыпания и зуд).

## **Передозировка:**

*Симптомы:* возбуждение, тошнота, головная боль, приливы крови.

*Лечение:* промывание желудка, прием активированного угля, при необходимости - проведение симптоматической терапии.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

С осторожностью следует применять Троксерутин Зентива при беременности. Возможность применения препарата при беременности определяется врачом.

Не рекомендуется применять препарат в период лактации (грудного вскармливания).

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При одновременном применении усиливает действие аскорбиновой кислоты на структуру и проницаемость сосудистой стенки.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

При лечении поверхностного тромбоза или тромбоза глубоких вен применение препарата Троксерутин Зентива не исключает необходимость назначения противовоспалительных и противотромботических препаратов.

*Использование в педиатрии*

Опыт применения препарата у детей и подростков в возрасте до 15 лет отсутствует.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Применение препарата Троксерутин Зентива не оказывает влияния на двигательные и психические реакции, не препятствует управлению транспортными средствами и работе с механизмами.

***При нарушениях функции почек***

С осторожностью следует применять препарат при почечной недостаточности (длительное применение).

***Применение в детском возрасте***

Противопоказано применение препарата у детей и подростков в возрасте до 18 лет (учитывая режим дозирования).

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

## **Срок годности:**

3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Trokserutin\\_Zentiva](http://drugs.thead.ru/Trokserutin_Zentiva)