Троксерутин (гель)



Код АТХ:

- C05CA04

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Троксерутин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Гель для наружного применения***	**100 г**
троксерутин	2 г

Вспомогательные вещества: карбомер 940 0.6 г, динатрия эдетат 0.05 г, бензалкония хлорид 0.1 г, натрия гидроксида раствор 30 % 0.7 г, вода очищенная 96.55 г.

25 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
25 г - банки оранжевого стекла (1) - пачки картонные.
25 г - банки оранжевого стекла (20) - коробки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Флавоноид (производное рутина), обладает Р-витаминной активностью; оказывает венотонизирующее, ангиопротекторное, противоотечное, антиоксидантное и противовоспалительное действие.

Участвует в окислительно-восстановительных процессах, блокирует гиалуронидазу, стабилизирует гиалуроновую кислоту клеточных оболочек и уменьшает проницаемость и ломкость капилляров, повышает их тонус. Увеличивает плотность сосудистой стенки, уменьшает экссудацию жидкой части плазмы и диапедез клеток крови.

Снижает воспаление в сосудистой стенке, ограничивая прилипание к ее поверхности тромбоцитов. Пациентам с хронической венозной недостаточностью рекомендуется применение как в начальных, так и в поздних стадиях заболевания. При состояниях, характеризующихся повышенной проницаемостью сосудов (в т.ч. при скарлатине, гриппе, кори, аллергических реакциях), используют в сочетании с аскорбиновой кислотой для усиления ее эффекта.

Не токсичен, имеет большую широту терапевтического действия.

Фармакокинетика

При нанесении геля на кожу активный компонент геля быстро проникает через эпидермис, через 30 мин обнаруживается в дерме, а через 2-5 ч в п/к жировой клетчатке.

Показания к применению:

— варикозная болезнь;

— хроническая венозная недостаточность, сопровождающаяся отечностью, болями, ощущением тяжести в ногах;

— тромбофлебит;

— перифлебит;

— варикозный дерматит;

— боли и отеки после травм (ушибы, повреждения связок).

Относится к болезням:

- Варикоз
- Варикозная болезнь
- Венозная недостаточность
- Дерматит
- Отеки
- Травмы
- Тромбоз
- Тромбофлебит
- Ушиб
- Ушибы

Противопоказания:

— повреждение целостности кожных покровов;

— детский возраст до 15 лет;

— повышенная чувствительность.

С *осторожностью:* почечная недостаточность (длительное использование).

Способ применения и дозы:

Наружно: гель наносят равномерно тонким слоем утром и вечером на кожу над болезненным участком и слегка массируют до полного всасывания. Доза препарата зависит от площади поврежденной поверхности, но не должна превышать 3-4 см геля (1.5-2 г). Гель можно накладывать под окклюзионную повязку.

Побочное действие:

В отдельных случаях возможны аллергические реакции (кожная сыпь).

Применение при беременности и кормлении грудью:

Прием препарата Троксерутин противопоказан в I триместре беременности. Лекарственный препарат можно применять во II и III триместре беременности, а также в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Нет данных о неблагоприятном взаимодействии троксерутина в виде геля с другими препаратами.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Не влияет.

При нарушениях функции почек

С *осторожностью:* почечная недостаточность (длительное использование).

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 15 лет.

Условия хранения:

Хранить препарат в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Trokserutin_gel