

Троксевазин Нео



Код АТХ:

- [C05CA54](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Гепарин натрия](#)
- [Декспантенол](#)
- [Троксерутин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{мнн} [мнн](#) [мнн](#) [Википедия](#)^{мнн} [мнн](#) [мнн](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Гель для наружного применения** от желтоватого до зеленовато-желтого цвета, прозрачный или почти прозрачный.

	1 г
гепарин натрия	1.7 мг (300 МЕ)
троксерутин	20 мг
декспантенол	50 мг

Вспомогательные вещества: карбомер - 7 мг, пропиленгликоль - 100 мг, метилпарагидроксибензоат - 0.8 мг, пропилпарагидроксибензоат - 0.2 мг, троламин - 4.2 мг, вода очищенная - до 1 г.

40 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

40 г - тубы ламинатные (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Гематотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для наружного применения. Действие обусловлено входящими в его состав ингредиентами.

Троксерутин - ангиопротекторное средство. Обладает Р-витаминной активностью: оказывает венотонизирующее, венопротекторное, противоотечное, противовоспалительное, противосвертывающее и антиоксидантное действие. Уменьшает проницаемость и ломкость капилляров, повышает их тонус. Увеличивает плотность сосудистой стенки. Способствует нормализации микроциркуляции и трофики тканей, уменьшает застойные явления.

Декспантенол - провитамин В₅ - в коже превращается в пантотеновую кислоту, входящую в состав кофермента А, который играет важную роль в процессах ацетилирования и окисления. Улучшая обменные процессы, декспантенол способствует регенерации поврежденных тканей; улучшает всасывание гепарина.

При местном применении активные вещества быстро абсорбируются кожей.

Троксерутин через 30 мин обнаруживается в дерме, а через 2-5 ч в подкожно-жировой клетчатке. Проникновение троксерутина в системный кровоток клинически незначимо.

Гепарин накапливается в верхних слоях и активно связывается с протеинами кожи. При наружном применении незначительное количество гепарина проникает в системный кровоток, не оказывая системного действия, не вызывая каких-либо изменений параметров свертывания крови. Не проникает через плацентарный барьер.

Декспантенол проникает во все слои кожи и превращается в пантотеновую кислоту, связывается с белками плазмы (главным образом с бета-глобулином и альбумином). Пантотеновая кислота не подвергается в организме метаболизму и выводится в неизмененном виде.

Показания к применению:

- варикозная болезнь;
- хроническая венозная недостаточность с такими симптомами как отечность и боли в ногах, чувство тяжести, налитости, усталости ног, сосудистые звездочки и сеточки, судороги, парестезии;
- тромбофлебит;
- перифлебит;
- варикозный дерматит;
- боли и отеки травматического характера (при ушибах, растяжениях, травмах).

Относится к болезням:

- Варикоз
- Варикозная болезнь
- Венозная недостаточность
- Дерматит
- Отеки
- Растяжение
- Сосудистые звездочки
- Судороги
- Травмы
- Тромбоз
- Тромбофлебит
- Ушиб

Противопоказания:

- открытые инфицированные раны или раны с обильной экссудацией в месте нанесения;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- детский и подростковый возраст младше 18 лет (опыт применения отсутствует).

Способ применения и дозы:

Применяют наружно. Гель наносят тонким слоем на область поражения 2 раза/сут утром и вечером, равномерно

распределяя по поверхности кожи легкими втирающими движениями до полного впитывания. При необходимости гель можно наносить под бинты или эластичные чулки.

Успех лечения препаратом в большой степени зависит от его регулярного применения в течение длительного времени. Курс лечения составляет 2-3 недели. Необходимость более длительного лечения определяет лечащий врач.

Повторный курс лечения рекомендуется проводить 2-3 раза в год.

Рекомендуется сочетать с приемом капсул Троксевазин для усиления воздействия.

Побочное действие:

Аллергические реакции: кожная сыпь, зуд (в месте нанесения препарата).

Передозировка:

Передозировка маловероятна в связи с малой системной абсорбцией активных компонентов геля.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Троксевазин Нео разрешен к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Взаимодействия препарата Троксевазин Нео с другими лекарственными средствами не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Избегать попадания на открытые раны, слизистые оболочки и в глаза!

Препарат Троксевазин Нео не предназначен для применения в офтальмологии, для интравагинального и ректального введения.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

На фоне приема препарата какого-либо отрицательного влияния на способность управлять автомобилем или другими техническими средствами не наблюдалось.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям и подросткам в возрасте младше 18 лет (опыт применения отсутствует).

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Troksevazin_Neo?page=2

