# Троксевазин (гель)




## Код АТХ:

- C05CA04

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Троксерутин

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

◊ ***Гель для наружного применения 2%*** от желтого до светло-коричневого цвета.

| | **1 г** |
|---|---|
| троксерутин | 20 мг |

*Вспомогательные вещества:* карбомер - 6 мг, троламин (триэтаноламин) - 7 мг, динатрия эдетата дигидрат - 0.5 мг, бензалкония хлорид - 1 мг, вода очищенная - 965.5 мг.

40 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
40 г - тубы ламинатные (пластиковые) (1) - пачки картонные.

## Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Троксевазин представляет собой флавоноид (производное рутина). Обладает Р-витаминной активностью; оказывает венотонизирующее, венопротекторное, противоотечное, противовоспалительное, противосвертывающее и антиоксидантное действие. Уменьшает проницаемость и ломкость капилляров, повышает их тонус. Увеличивает плотность сосудистой стенки, уменьшает экссудацию жидкой части плазмы и диапедез клеток крови.

Уменьшает воспаление в сосудистой стенке, ограничивая прилипание тромбоцитов к ее поверхности.

***Фармакокинетика***

При нанесении геля на область поражения, активное вещество быстро проникает через эпидермис, через 30 мин обнаруживается в дерме, а через 2-5 ч в подкожной жировой клетчатке.

## Показания к применению:

— варикозная болезнь;

— хроническая венозная недостаточность с такими симптомами как: отечность и боли в ногах; чувство тяжести, налитости, усталости ног; сосудистые звездочки и сеточки, судороги, парестезии;

— тромбофлебит;

— перифлебит;

— варикозный дерматит;

— боли и отеки травматического характера (при ушибах, растяжениях, травмах).

## Относится к болезням:

- Варикоз
- Варикозная болезнь
- Венозная недостаточность
- Дерматит
- Отеки
- Растяжение
- Сосудистые звездочки
- Травмы
- Тромбоз
- Тромбофлебит
- Ушиб

## Противопоказания:

— нарушение целостности кожных покровов;

— повышенная чувствительность к препарату.

## Способ применения и дозы:

Наружно.

Гель наносят на область поражения 2 раза/сут утром и вечером, мягко втирая до полного впитывания. При необходимости гель можно наносить под бинты или эластичные чулки.

Успех лечения препаратом в большой степени зависит от его регулярного применения в течение длительного времени.

Рекомендуется сочетать с приемом капсул Троксевазин для усиления воздействия. Если симптомы течения заболевания ухудшаются или не проходят через 6-7 дней ежедневного применения препарата, пациенту следует обратиться к врачу.

## Побочное действие:

В *редких случаях* наблюдаются аллергические кожные реакции - крапивница, экзема, дерматит.

## Передозировка:

Ввиду наружного способа применения и большой терапевтической широты препарата опасности возникновения передозировки нет. При случайном проглатывании большого количества геля необходимо провести общие меры выведения препарата из организма (рвотные средства) и обратиться к врачу. При наличии показаний проводится перитонеальный диализ.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Данных относительно нежелательного воздействия на плод и новорожденного при использовании препарата нет.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

В настоящее время данные о лекарственном взаимодействии препарата Троксевазин отсутствуют.

## Особые указания и меры предосторожности:

Гель наносят только на неповрежденную поверхность.

Избегать попадания на открытые раны, глаза и слизистые оболочки.

При состояниях, характеризующихся повышенной проницаемостью сосудов (в т.ч. при скарлатине, гриппе, кори, аллергических реакциях), гель используют в сочетании с аскорбиновой кислотой для усиления ее эффекта.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Троксевазин гель не оказывает влияния на способность управлять автотранспортным средством и работать с движущимися механизмами,

## Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С. Не замораживать. Срок годности для препарата в алюминевой тубе - 5 лет, в ламинатной (пластиковой) тубе - 2 года.

## Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Troksevazin_gel