Тромблесс



Код АТХ:

- C05BA03

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Гепарин натрия

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Гель для наружного применения*** бесцветный или со слабым желтоватым оттенком, прозрачный, со специфическим запахом.

	1 г
гепарин натрия	1000 ЕД*

Вспомогательные вещества: этанол (спирт этиловый) - 240 мг, метилпарагидроксибензоат (нипагин, метилпарабен) - 1.2 мг, пропилпарагидроксибензоат (нипазол, пропилпарабен) - 300 мкг, диэтаноламин (2,2'-иминодиэтанол) - до 14 мг (для получения геля с pH от 7.5 до 8.7), карбомер (карбопол) - до 15 мг, вода (вода очищенная) - до 1 г.

* 8.33 мг при активности гепарина 120 ЕД/мг.

10 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
20 г – тубы алюминиевые (1) – пачки картонные.
30 г – тубы алюминиевые (1) – пачки картонные.
40 г – тубы алюминиевые (1) – пачки картонные.
50 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
10 г - тубы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
20 г - тубы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
30 г - тубы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
40 г - тубы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
50 г - тубы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Гематотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Прямой антикоагулянт. Оказывает противовоспалительное, антипролиферативное, противоотечное и анальгезирующее действие. Уменьшает агрегацию тромбоцитов, связывается антитромбином III, предупреждая переход протромбина в тромбин. Угнетает активность тромбина. Снижает активность гиалуронидазы, повышает фибринолитические свойства крови.

Тромблесс улучшает микроциркуляцию и активирует тканевой обмен, благодаря этому ускоряет процессы рассасывания гематом и тромбов, в конечном итоге восстанавливает проходимость вен, клинически это сопровождается выраженным обезболивающим и противовоспалительным действием.

Фармакокинетика

Незначительное количество гепарина абсорбируется с поверхности кожи в системный кровоток. C_{max} активного вещества в крови отмечается через 8 ч после аппликации. Гепарин выводится главным образом с мочой. $T_{1/2}$ составляет 12 ч.

Показания к применению:

— мигрирующие флебиты (в т.ч. при хронической варикозой болезни и варикозных язвах);

— тромбофлебит поверхностных вен;

— местные отеки и асептические инфильтраты;

— осложнения, возникшие после хирургических операций на венах;

— подкожные гематомы (в т.ч. после флебэктомии);

— травмы, ушибы суставов, сухожилий, мышечной ткани.

Относится к болезням:

- Варикоз
- Инфильтраты
- Отеки
- Травмы
- Тромбоз
- Тромбофлебит
- Ушиб
- Ушибы
- Флебит
- Язва

Противопоказания:

— язвенно-некротические, гнойные процессы на коже;

— травматическое нарушение целостности кожных покровов;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью: повышенная склонность к кровоточивости, тромбоцитопения.

Способ применения и дозы:

Препарат следует применять наружно: 3-10 см геля втирающими движениями наносят на кожу над пораженным участком 1-3 раза/сут.

При тромбозе геморроидальных вен используют прокладки с нанесенным гелем.

Побочное действие:

Местные реакции: при длительном применении возможны гиперемия кожи, аллергические реакции.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата Тромблесс не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение препарата при беременности и в период лактации по показаниям.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Совместное применения препарата с пероральными антикоагулянтами может вызвать увеличение протромбинового времени.

Особые указания и меры предосторожности:

Тромблесс не обладает местнораздражающим действием.

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Trombless