

Тропикамид



Код АТХ:

- [S01FA06](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Тропикамид](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Капли глазные 0.5% бесцветные, прозрачные.

	1 мл
тропикамид	5 мг

Вспомогательные вещества: натрия хлорид, динатрия эдетат дигидрат, бензалкония хлорид, хлороводородная кислота, вода очищенная.

10 мл - флаконы пластиковые (1) с пробкой-капельницей - пачки картонные.

Капли глазные 1% бесцветные, прозрачные.

	1 мл
тропикамид	10 мг

Вспомогательные вещества: натрия хлорид, динатрия эдетат дигидрат, бензалкония хлорид, хлороводородная кислота, вода очищенная.

10 мл - флаконы пластиковые (1) с пробкой-капельницей - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Вегетотропные средства](#)
- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Мидриатик. Блокирует м-холинорецепторы сфинктера радужки и цилиарной мышцы, вызывая кратковременный мидриаз и паралич аккомодации. Незначительно повышает внутриглазное давление.

Мидриаз развивается через 5-10 мин, достигает максимума через 20-45 мин и сохраняется в течение 1 ч. Через 6 ч

Тропикамид

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

происходит возвращение зрачка к первоначальному размеру.

Фармакокинетика

Процент всасывания тропикамида, поступающего через слезные каналы в нос, относительно высокий (возможны побочные эффекты, обусловленные системным действием).

Показания к применению:

Капли глазные 0.5%

— для диагностических целей при проведении офтальмоскопии и определения рефракции (в т.ч. при повышенной чувствительности к другим препаратам, расширяющим зрачок);

— для профилактики развития синехий в комплексной терапии воспалительных заболеваний глаз.

Капли глазные 1%

— при необходимости паралича аккомодации при исследовании рефракции.

Относится к болезням:

- [Паралич](#)

Противопоказания:

— глаукома (особенно закрытоугольная);

— внутриглазная гипертензия;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью следует применять препарат при беременности, в период лактации, а также у пациентов грудного возраста.

Способ применения и дозы:

Препарат следует вводить конъюнктивально.

Капли глазные 0.5%

Для диагностического расширения зрачка препарат закапывают по 1-3 капли в течение 10 мин. При 3-разовом закапывании через 10 мин можно проводить офтальмоскопию.

Для определения рефракции препарат закапывают 6 раз с интервалом 6-12 мин.

При применении в лечебных целях препарат закапывают до 6 раз/сут.

Капли глазные 1%

Для эффекта циклоплегии при исследовании рефракции закапывают по 1-2 капли раствора; закапывание повторяют через 5 мин. Если пациент не был обследован в течение 20-25 мин, можно дополнительно закапать 1 каплю для продления мидриаза.

Побочное действие:

Местные реакции: аллергические реакции, повышение внутриглазного давления, фотофобия, снижение остроты зрения.

Системные побочные эффекты: головная боль, психотические реакции, тахикардия, снижение АД, гипертермия, сухость во рту, дизурия, судороги.

Передозировка:

При местном применении Тропикамида передозировка маловероятна.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение Тропикамида при беременности возможно только в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Следует с осторожностью применять препарат в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении адреномиметики могут усилить, а м-холиномиметики - ослабить эффект тропикамида.

Трициклические антидепрессанты, фенотиазины, амантадин, хинидин, антигистаминные препараты повышают вероятность развития побочных эффектов при одновременном применении с тропикамидом.

Особые указания и меры предосторожности:

В состав препарата входит консервант бензалкония хлорид, который может откладываться на поверхности мягких контактных линз. В связи с этим в период лечения не рекомендуется использовать мягкие контактные линзы. Жесткие контактные линзы следует снимать перед закапыванием и устанавливать их не ранее, чем через 15 мин после процедуры.

Для уменьшения резорбтивного действия препарата рекомендуется легкое надавливание пальцем на область слезного мешка в течение 2-3 мин после закапывания.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В период лечения Тропикамидом необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятиях потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в закрытой оригинальной упаковке в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

После вскрытия флакона препарат следует хранить не более 4 недель.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Tropikamid>