

## [Трувент](#)



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Трoвентол](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Бронхолитическое средство, м-холиноблокатор. Особенностью по сравнению с атропином является более сильное и длительное влияние на холинорецепторы бронхиальной мускулатуры. Не проникает в ЦНС. Бронхорасширяющий эффект развивается через 15-30 мин после ингаляции и сохраняется в течение 4-5 ч.

### **Показания к применению:**

Бронхоспастический синдром: ХОБЛ, бронхиальная астма (легкой и средней тяжести), пневмония (острая и хроническая).

### **Относится к болезням:**

- [Астма](#)
- [Пневмония](#)

### **Противопоказания:**

Закрyтоyгoльнaя глaукомa, бeрeмeннoсть, пoвышeннaя чувствитeльнoсть к трoвeнтoлу

### **Способ применения и дозы:**

Применяется в виде ингаляций. Суточная доза определяется индивидуально и составляет от 120 до 480 мкг. Начальная доза - 40 мкг, при недостаточном эффекте дозу повышают до 80 мкг. При необходимости увеличивают разовую дозу до 160 мкг.

### **Побочное действие:**

*Возможно:* сухость во рту, першение в горле, паралич аккомодации, нарушение четкости зрения, повышение внутриглазного давления.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказан при беременности.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Возможно сгущение мокроты, что нежелательно при вязкой трудноотделяемой мокроте.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Truvent>