

Тубосан



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Метилдиоксотетрагидропиримидин сульфонизоникотиноил гидразид](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Иммуностимулирующее средство, оказывает влияние на все звенья иммунной системы; активен в отношении микобактерий туберкулеза, лепры (в т.ч. резистентных форм), вирусов герпеса.

Фармакокинетика

Время достижения C_{max} - 6 ч, терапевтическая концентрация поддерживается в течение 12-18 ч.

Выводится через ЖКТ - 50%.

Показания к применению:

Заболевания на фоне вторичного иммунодефицитного состояния:

- туберкулез;
- лепра;
- хламидиоз;
- герпетическая инфекция.

Относится к болезням:

- [Герпес](#)
- [Инфекции](#)
- [Лепра](#)
- [Туберкулез](#)

Противопоказания:

Тубосан

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

- гиперчувствительность;
- беременность;
- период лактации.

Способ применения и дозы:

Внутрь, 200-400 мг за 30 мин до или через 2 ч после еды. Максимальная суточная доза - 1.6 г. При острых заболеваниях курс лечения - 2-3 нед; при хронических - 6-12 мес.

Побочное действие:

Аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности, в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Усиливает действие антибактериальных лекарственных средств (в т.ч. макролидов, цефалоспоринов, аминогликозидов).

Источник: <http://drugs.thead.ru/Tubosan>