Тубосан



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Метилдиоксотетрагидропиримидин сульфонизоникотиноил гидразид

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Иммуностимулирующее средство, оказывает влияние на все звенья иммунной системы; активен в отношении микобактерий туберкулеза, лепры (в т.ч. резистентных форм), вирусов герпеса.

Фармакокинетика

Время достижения C_{max} - 6 ч, терапевтическая концентрация поддерживается в течение 12-18 ч.

Выводится через ЖКТ - 50%.

Показания к применению:

Заболевания на фоне вторичного иммунодефицитного состояния:

— туберкулез;

— лепра;

— хламидиоз;

— герпетическая инфекция.

Относится к болезням:

- Герпес
- Инфекции
- Лепра
- Туберкулез

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— беременность;

— период лактации.

Способ применения и дозы:

Внутрь, 200-400 мг за 30 мин до или через 2 ч после еды. Максимальная суточная доза - 1.6 г. При острых заболеваниях курс лечения - 2-3 нед; при хронических - 6-12 мес.

Побочное действие:

Аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности, в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Усиливает действие антибактериальных лекарственных средств (в т.ч. макролидов, цефалоспоринов, аминогликозидов).

Источник: http://drugs.thead.ru/Tubosan