Туссамаг

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Тимьяна обыкновенного травы экстракт

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Сироп 9%*** (без сахара) в виде жидкости коричневого цвета с запахом тимьяна.

	1 г	**100 г**
жидкий экстракт тимьяна	90 мг	9 г

Вспомогательные вещества: калия сорбат - 0.1 г, лимонной кислоты моногидрат - 0.08 г, карамель 15750 - 0.2 г, глицерол 85% - 20 г, сорбитол 70% - 45 г, вода очищенная - 25.62 г.

175 г - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

◊ ***Сироп*** в виде жидкости коричневого цвета с характерным запахом.

	1 г	**100 г**
жидкий спиртовой экстракт травы тимьяна	90 мг	9 г

Вспомогательные вещества: натрия бензоат - 0.147 г, каштана листьев экстракт густой спиртовой - 1.755 г, хлористоводородная кислота 25% - 0.149 г, глицерол 85% - 0.633 г, карамель церестар 15750 - 0.4 г, сахароза 66.5% - 79.7 г, вода очищенная - 8.215 г.

200 г - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

◊ ***Капли для приема внутрь*** в виде прозрачной жидкости красновато-коричневого цвета с характеным запахом тимьяна.

	100 г
жидкий спиртовой экстракт травы тимьяна	50 г

Вспомогательные вещества: сорбитол жидкий некристаллизующийся - 50 г.

20 г - флаконы темного стекла с пробкой-капельницей (1) - пачки картонные.
50 г - флаконы темного стекла с пробкой-капельницей (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Фитопрепарат с отхаркивающим действием; разжижает мокроту и уменьшает ее вязкость, способствуя лучшему ее отхождению.

Действующие вещества 9% сиропа - тимол и карвакрол - оказывают также противомикробное действие.

Фармакокинетика

В соответствии с Международной конвенцией (EMEAHMPWG11/99) при проведении клинических испытаний препаратов растительного происхождения не требуется изолированное исследование фармакокинетических параметров.

Показания к применению:

— заболевания верхних дыхательных путей с затруднением отхождения мокроты (бронхит, трахеит, трахеобронхит).

Относится к болезням:

- Бронхит
- Трахеит
- Трахеобронхит

Противопоказания:

— хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации;

— почечная недостаточность;

— печеночная недостаточность;

— беременность;

— период грудного вскармливания;

— детский возраст до 1 года;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует применять Туссамаг капли для приема внутрь при алкоголизме, тяжелых заболеваниях печени.

С *осторожностью* следует применять Туссамаг сироп у пациентов с сахарным диабетом.

Способ применения и дозы:

Туссамаг *капли для приема внутрь* можно применять в неразбавленном виде, разбавлять водой или на кусочке сахара.

Взрослым назначают по 40-60 кап. 3-4 раза/сут.

Детям в возрасте старше 5 лет и подросткам назначают по 20-50 кап. 3 раза/сут.

Детям в возрасте от 1 года до 5 лет назначают по 10-25 кап. 2-3 раза/сут.

Туссамаг *сироп* и *сироп 9%* следует принимать внутрь, желательно после еды.

Взрослым назначают по 2-3 чайн.л. (10-15 мл) 3-4 раза/сут.

Детям в возрасте старше 5 лет и подросткам назначают по 1-2 чайн.л. (5-10 мл) 3-4 раза/сут.

Детям в возрасте от 1 года до 5 лет назначают по 1 чайн.л. (5 мл) 2-3 раза/сут.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции, тошнота (для сиропа и капель для приема внутрь).

Возможно: аллергические реакции (для сиропа 9%).

Передозировка:

До настоящего времени сведения о случаях передозировки отсутствуют.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано применение препарата при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Одновременное применение Туссамаг сиропа и капель для приема внутрь с противокашлевыми препаратами, лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, препятствует откашливанию разжиженной мокроты.

Взаимодействие Туссамаг сиропа 9% с другими препаратами не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Туссамаг капли для приема внутрь содержат 19 об.% этанола, сироп и сироп 9% - 4 об.% этанола.

При назначении Туссамаг сиропа 9% (флакон 175 г) пациентам с сахарным диабетом следует учитывать, что 1 чайная ложка сиропа без сахара содержит 1.85 г сорбитола, что составляет 0.15 ХЕ.

При назначении Туссамаг сиропа (флакон 200 г) пациентам с сахарным диабетом следует учитывать, что 1 чайная ложка сиропа содержит 3.3 г сахарозы, что составляет 0.28 ХЕ.

Препарат содержит растительный экстракт, в связи с чем возможно легкое помутнение раствора или появление осадка во флаконе, однако это не влияет на эффективность препарата.

При нарушениях функции почек

Противопоказано применение Туссамаг сиропа и капель для приема внутрь при почечной недостаточности.

При нарушениях функции печени

Противопоказано применение Туссамаг сиропа и капель для приема внутрь при печеночной недостаточности.

С *осторожностью* следует применять Туссамаг сироп и капли для приема внутрь при тяжелых заболеваниях печени.

Применение в детском возрасте

Противопоказание: детский возраст до 1 года.

Туссамаг *капли для приема внутрь* можно применять в неразбавленном виде, разбавлять водой или на кусочке сахара.

Детям в возрасте старше 5 лет и подросткам назначают по 20-50 кап. 3 раза/сут.

Детям в возрасте от 1 года до 5 лет назначают по 10-25 кап. 2-3 раза/сут.

Туссамаг*сироп* и *сироп 9%* следует принимать внутрь, желательно после еды.

Детям в возрасте старше 5 лет и подросткам назначают по 1-2 чайн.л. (5-10 мл) 3-4 раза/сут.

Детям в возрасте от 1 года до 5 лет назначают по 1 чайн.л. (5 мл) 2-3 раза/сут.

Условия хранения:

Туссамаг капли для приема внутрь следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.
Туссамаг сироп и сироп 9% следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C.
Препарат не замораживать! Срок годности препарата - 3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Tussamag