Туссин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Сироп*** в виде густой жидкости темно-красного цвета с вишневым запахом.

	5 мл
гвайфенезин	100 мг

Вспомогательные вещества: сироп кукурузный, карамель, натрия сахарин, лимонная кислота, ароматизатор вишневый, ментол, натрия бензоат, глицерол, пропиленгликоль, краситель красный очаровательный, вода очищенная.

118 мл - флаконы пластиковые (1) в комплекте с дозировочным стаканчиком - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Муколитическое и отхаркивающее средство, снижает вязкость мокроты, облегчает ее удаление и способствует переходу непродуктивного кашля в продуктивный. Длительность действия при однократном приеме – 3.5-4 ч.

Фармакокинетика

Абсорбция из ЖКТ быстрая (через 25-30 мин после приема внутрь). $T_{1/2}$ - 1 ч. Проникает в ткани, содержащие кислые мукополисахариды. Метаболизм - в печени. Выводится легкими (с мокротой) и почками в виде неактивных метаболитов.

Показания к применению:

Кашель с затрудненным отхождением мокроты при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей:

— при острых вирусных инфекциях;

— при гриппе;

— при острых ларингитах, фарингитах, трахеитах, бронхитах.

Относится к болезням:

- Бронхит
- Инфекции
- Ларингит
- Трахеит
- Фарингит

Противопоказания:

— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадия обострения;

— желудочное кровотечение в анамнезе;

— детский возраст до 2 лет;

— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью - беременность, период лактации, детский возраст до 12 лет.

Способ применения и дозы:

Применяйте не более 4-6 разовых доз в течение суток. Препарат необходимо применять после еды.

Разовая доза: **детям от 2 до 6 лет** - 1/2 -1 чайная ложка (50-100 мг) с интервалом 6-8 ч. **Детям от 6 до 12 лет** - 1-2 чайные ложки (100-200 мг) 3-4 раза/сут . **Детям от 12 лет и взрослым** - 2-4 чайные ложки (200-400 мг) 3-4 раза/сут.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, боль в животе, диарея.

Со стороны нервной системы: головокружение, головная боль, сонливость.

Аллергические реакци: кожная сыпь, крапивница.

Передозировка:

Особенно высокие дозы гвайфенезина могут вызвать тошноту и рвоту.

При рвоте следует проводить мероприятия по восполнению жидкости в организме и следить за уровнем электролитов.

Применение при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью - беременность, период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не назначают одновременно с лекарственными средствами, подавляющими кашлевой центр (в т.ч. кодеином), поскольку это затрудняет отхождение разжиженной мокроты.

Совместим с бронхолитиками, противомикробными средствами, сердечными гликозидами.

Особые указания и меры предосторожности:

Возможно окрашивание мочи в розовый цвет.

Результаты определения 5-гидроксииндолуксусной кислоты в моче (при использовании нитрозонафтольного реактива) могут быть ложно завышены вследствие влияния метаболитов гвайфенезина на цвет (прием гвайфенезина следует прекращать за 48 ч до сбора мочи для данного теста).

Гвайфенезин и его метаболиты могут вызывать изменение цвета при определении ванилилминдальной кислоты в

моче и ложно завышать результаты теста с ванилилминдальной кислотой на содержание в моче катехоламинов (прием гвайфенезина следует прекращать за 48 ч до сбора мочи для данного теста)

Применение в детском возрасте

Противопоказано: детский возраст до 2 лет. *С осторожностью* - детский возраст до 12 лет.

Условия хранения:

Хранить при температуре от 15 до 25°C. Не хранить в холодильнике! Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Tussin