

## Туссин Плюс



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Сироп** оранжево-красного цвета со слабым запахом вишни.

	<b>5 мл</b>
Гвайфенезин	100 мг
декстрометорфана гидробромид	10 мг

*Вспомогательные вещества:* лимонная кислота, вкусовая добавка, глицерол, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, натрия сахарин, натрия бензоат, ароматизатор вишневый, краситель FD&C красный №40, вода.

118 мл - флаконы из полиэтилентерефталата (1) в комплекте с мерным стаканчиком - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Гвайнефезин обладает отхаркивающим действием за счет увеличения секреции жидких компонентов бронхиальной слизи, деполимеризации кислых мукополисахаридов, повышения активности реснитчатого эпителия.

Декстрометорфан подавляет чрезмерно интенсивные афферентные импульсы со слизистой оболочки дыхательных путей, повышает кашлевой порог, снижая интенсивность сухого раздражающего кашля. Декстрометорфан является D-изомером леворфанолола, по силе действия близок к кодеину, однако не обладает анальгетическими свойствами, не угнетает дыхательный центр и активность реснитчатого эпителия. Длительность противокашлевого действия составляет 5-6 ч.

#### Фармакокинетика

Гвайфенезин быстро всасывается из ЖКТ (через 25-30 мин после приема внутрь).  $T_{1/2}$  - 1 ч. Проникает в ткани, содержащие кислые мукополисахариды. Метаболизируется в печени. Выводится легкими (с мокротой) и почками в виде неактивных метаболитов.

Декстрометорфан быстро всасывается в ЖКТ и его действие начинает проявляться через 15-30 мин. Декстрометорфан метаболизируется, в первую очередь, ферментами печени, подвергаясь O-деметилиации, N-деметилиации и частичному связыванию с глюкуроновой кислотой и сульфатами. У человека (+)-3-гидрокси-г4-метилморфинан, (+)-3-гидроксиморфинан и следы не метаболизированного препарата могут выявляться в моче после перорального приема.

### Показания к применению:

— облегчение симптомов простудных заболеваний, гриппа, ОРВИ, сопровождающихся кашлем.

## Относится к болезням:

- [Грипп](#)

## Противопоказания:

- тяжелые органические заболевания ЦНС;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- желудочное кровотечение (в анамнезе);
- влажный кашель с обильным отхождением мокроты;
- одновременный прием препаратов, содержащих вещества входящие в состав препарат Туссин Плюс;
- детский возраст до 6 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* применять у больных с почечной и печеночной недостаточностью, бронхиальной астмой, при беременности и в период лактации.

## Способ применения и дозы:

Принимать внутрь после еды при помощи чайной ложки или мерного стаканчика.

Для **взрослых и детей старше 12 лет** - по 2 чайные ложки каждые 4 ч.

Для **детей (6-12 лет)** - 1 чайная ложка каждые 4 ч.

## Побочное действие:

Диспепсия (тошнота, рвота), диарея, обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, головокружение, головная боль, сонливость или бессонница, повышенная возбудимость (особенно у детей), аллергические реакции (кожная сыпь, крапивница, гипертермия).

## Передозировка:

*Симптомы:* особенно высокие дозы гвайфенезина могут вызвать тошноту и рвоту.

*Лечение:* следует проводить мероприятия по восполнению жидкости организма, следить за уровнем электролитов.

*Симптомы, обусловленные декстрометорфаном:* возбуждение, головокружение, угнетения дыхания, нарушение сознания, снижение АД, тахикардия, гипертонус мышц, атаксия.

*Лечение:* промывание желудка, прием активированного угля, симптоматическая терапия.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

С *осторожностью* применять при беременности и в период лактации.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Туссин Плюс совместим с бронхолитиками, противомикробными средствами, сердечными гликозидами.

Туссин Плюс не назначают одновременно с противокашлевыми (в т.ч. содержащими кодеин) и муколитическими

средствами.

Несовместим с лекарственными средствами, ингибирующими MAO (в т.ч. фуразолидон, прокарбазин, селегилин), которые при одновременном применении могут вызвать адренергический криз, коллапс, кому, головокружение, возбуждение, повышение АД, гиперпирексию, внутричерепное кровотечение, сонливость, тошноту, спазмы, тремор.

Амиодарон, флуоксетин, хинидин, ингибируя систему цитохрома P450, могут повышать концентрацию препарата в крови.

Табачный дым может привести к повышению секреции желез на фоне ингибирования кашлевого рефлекса.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Во время лечения рекомендуется принимать достаточное количество жидкости.

Возможно окрашивание мочи в розовый цвет.

Результаты определения 5-гидроксииндолуксусной кислоты в моче (при использовании нитрозоафтаольного реактива) могут быть ложно завышены вследствие влияния метаболитов гвайфенезина на цвет (прием гвайфенезина следует прекращать за 48 ч до сбора мочи для данного теста).

Гвайфенезин и его метаболиты могут вызывать изменение цвета при определении ванилилминдальной кислоты в моче и ложно завышать результаты теста с ней на катехины (прием гвайфенезина следует прекращать за 48 ч до сбора мочи для данного теста).

Препарат Туссин Плюс поставляется с дозировочным стаканчиком с делениями 1 TSP = 1 чайной ложке = 5 мл.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

В период лечения следует соблюдать осторожность при выполнении работы, требующей концентрации внимания, повышенной скорости двигательных и психических реакций, а также воздержаться от приема алкоголя.

### **При нарушениях функции почек**

С осторожностью применять у больных с почечной недостаточностью.

### **При нарушениях функции печени**

С осторожностью применять у больных с печеночной недостаточностью.

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказан детям до 6 лет.

Детям **6-12 лет**: 1 чайная ложка каждые 4 ч.

## **Условия хранения:**

Препарат хранить при температуре от 15° до 30°C. Не хранить в холодильнике. Хранить в недоступном для детей месте. Не использовать по истечении срока годности.

## **Срок годности:**

3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Tussin\\_Plyus](http://drugs.thead.ru/Tussin_Plyus)