Тыквеол



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Тыквы обыкновенной семян масло

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru

Форма выпуска:

◊ ***Капсулы*** мягкие, желатиновые, овальной формы, с продольным швом.

	1 капс.
масло семян тыквы	450 мг

50 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.
84 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.

◊ ***Масло для приема внутрь*** в виде маслянистой жидкости от зеленовато-коричневого до красно-коричневого цвета с характерным запахом; допускается наличие осадка.

	1 фл.
масло семян тыквы	100 мл

100 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

◊ ***Суппозитории ректальные*** от светло-зеленого до темно-зеленого цвета, цилиндрические, с заостренным или закругленным концом.

	1 супп.
масло семян тыквы	500 мг

Вспомогательные вещества: масло какао.

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комплексный препарат, содержащий биологически активные вещества, получаемые из семян тыквы.

Высокое содержание токоферолов (альфа-, бета-, гамма-, сигма-изомеры) и каротиноидов оказывает выраженное антиоксидантное действие, угнетающее процессы перекисного окисления липидов в биологических мембранах.

Эссенциальные фосфолипиды оказывают гепатопротекторное действие, способствуют восстановлению клеточной мембраны гепатоцитов, ее структуры и функции.

Эссенциальные жирные кислоты участвуют в липидном обмене, в регуляции обмена холестерина и триглицеридов, в метаболизме арахидоновой кислоты (как биохимического предшественника простагландинов).

Суммарная совокупность фармакологических свойств биологически активных веществ в препарате Тыквеол определяет его противовоспалительное и цитопротекторное действие при местном применении.

Тыквеол улучшает функциональное состояние желчевыводящих путей, изменяя химический состав желчи, обладает легким желчегонным действием, уменьшает воспалительные явления в эпителии желчевыводящей системы.

Тыквеол, обладая антиандрогенными свойствами, снижает пролиферацию клеток предстательной железы, нормализует ее функцию за счет улучшения микроциркуляции и противовоспалительного действия.

Фармакокинетика

Действие препарата Тыквеол является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований. По этой же причине невозможно обнаружить и метаболиты препарата.

Показания к применению:

Для приема внутрь:

— цирроз печени;

— хронический гепатит;

— жировая дегенерация печени;

— инфекционный гепатит;

— токсические поражения печени (лекарственными средствами, промышленными ядами, алкоголем);

— холецистит (некалькулезный);

— холестаз;

— дискинезия желчевыводящих путей;

— гастрит;

— колит, энтероколит (неинфекционного генеза);

— геморрой;

— атеросклероз;

— простатит;

— доброкачественная гиперплазия предстательной железы.

Для ректального применения:

— хронический простатит;

— доброкачественная гиперплазия предстательной железы I-II стадии с сопутствующим простатитом.

Для наружного и местного применения:

— герпес;

— дерматит;

— псориаз;

— экзема;

— ожоги и ожоговая болезнь;

— эрозия шейки матки;

— кольпит, эндоцервицит;

— заболевания пародонта.

Относится к болезням:

- Атеросклероз
- Гастрит
- Геморрой
- Гепатит
- Гепатоз
- Герпес
- Гиперплазия предстательной железы
- Дерматит
- Дискинезия желчевыводящих путей
- Жировая дегенерация печени
- Инфекции
- Колит
- Кольпит
- Кольпит
- Ожоги
- Пародонтит
- Простатит
- Псориаз
- Холера
- Холецистит
- Экзема
- Энтерит

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Внутрь назначают препарат за 30 мин до еды по 1 чайной ложке масла 3-4 раза/сут в течение 1-3 мес или по 4 капсулы 3 раза/сут во время или после еды.

При **наружном и местном применении** смазывают пораженные участки 2-3 раза/сут.

При *геморрое и простатите* (наряду с пероральным применением) назначают микроклизмы 2 раза/сут.

При *пародонтозе* назначают местные аппликации препарата.

В *гинекологической практике* применяют вагинальные тампоны, пропитанные препаратом в дозе 10 мл.

Суппозитории ректальные вводят в прямую кишку (предварительно смочив водой) по 1 супп. 1-3 раза/сут. Курс лечения составляет от 10 дней до 3 мес, или проводят короткие курсы лечения по 10-15 дней на протяжении 6 мес.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: редко - диспепсия, диарея.

Прочие: аллергические реакции.

Передозировка:

Симптомы: диарея.

Лечение: необходимо снизить дозу препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Клинические данные об эффективности и безопасности применения Тыквеола при беременности и в период лактации отсутствуют.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимого взаимодействия Тыквеола с другими лекарственными препаратами не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

В случае развития побочных эффектов необходимо снизить дозу препарата.

Тыквеол применяют как в виде монотерапии, так и в составе комплексной терапии.

Препарат совместим с любыми пищевыми продуктами.

При воспалительных и дегенеративных процессах слизистой оболочки верхних отделов ЖКТ рекомендуют принимать Тыквеол в форме масла, следует избегать приема препарата в форме капсул.

Использование в педиатрии

Клинические данные об эффективности и безопасности применения препарата у детей отсутствуют.

Условия хранения:

Капсулы и масло для приема внутрь следует хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от -10° до +25°С. Суппозитории ректальные следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 5°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Tykveol