

Тысячелистника травы брикет круглый



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Тысячелистника обыкновенного трава](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство растительного происхождения. Благодаря содержанию хинаголида и гермакранолида оказывает желчегонное действие. Дубильные вещества, эфирное масло и хамазулен обеспечивают противовоспалительное, бактерицидное, противоаллергическое и ранозаживляющее действие травы тысячелистника; флавоноиды и эфирные масла обеспечивают спазмолитическое действие на гладкие мышцы; горький алкалоид ахиллеин раздражает окончания вкусовых нервов и усиливает секрецию желудочного сока. Механизм кровоостанавливающего действия травы тысячелистника сходен с эффектами, обусловленными ионами кальция. Активные вещества тысячелистника активируют действие фибрина, но никогда не приводят к образованию тромбов.

Показания к применению:

Потеря аппетита, диспептические явления, дискинезия желчевыводящих путей и желчного пузыря; маточные кровотечения, вызванные воспалительными процессами, фибромиомами; геморроидальные кровотечения, желудочно-кишечные кровотечения.

Относится к болезням:

- [Геморрой](#)
- [Дискинезия желчевыводящих путей](#)
- [Желудочно-кишечное кровотечение](#)
- [Фиброз](#)
- [Фиброма](#)

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к тысячелистнику.

Способ применения и дозы:

Принимают внутрь в виде приготовленного настоя (7 г на 200 мл воды) по 1/3-1/2 стакана 2-3 раза/сут.

Побочное действие:

При применении в рекомендуемых дозах не выявлено.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препараты тысячелистника не следует применять при беременности.

Особые указания и меры предосторожности:

Сесквитерпеновый лактон и альфа-пероксиакфолид, содержащиеся в тысячелистнике, могут вызывать контактный дерматит.

Препараты тысячелистника не следует применять при беременности.

Приготовленный настой хранить в прохладном месте не более 2 суток.

Источник: http://drugs.thead.ru/Tysyachelistnika_travy_briket_kruglyy