

Убихинон Композитум



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#)
[Горздрав](#)
[Столички](#)
[Апрель](#)
[Госреестр](#)
[Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#)
[Mail.Ru](#)
[Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Раствор для в/м введения гомеопатический бесцветный, прозрачный, без запаха.

	1 амп.
Ubichinonum (убихинонум) D10	22 мкл
Acidum ascorbicum (ацидум аскорбикум) D6	22 мкл
Thiaminum hydrochloricum (тиаминам гидрохлорикум) D6	22 мкл
Natrium riboflavinum phosphoricum (натриум рибофлавинум фосфорикум) D6	22 мкл
Pyridoxinum hydrochloricum (Pyridoxinhydrochlorid) (пиридоксинум гидрохлорикум (пиридоксингидрохлорид)) D6	22 мкл
Nicotinamidum (никотинамидум) D6	22 мкл
Vaccinium myrtillus (Myrtillus) (вацциниум миртиллюс (миртиллюс)) D4	22 мкл
Colchicum autumnale (Colchicum) (колхикум отумнале (колхикум)) D4	22 мкл
Podophyllum peltatum (Podophyllum) (подофиллюм пельтатум (подофиллюм)) D4	22 мкл
Conium maculatum (Conium) (кониум макулятум (кониум)) D4	22 мкл
Hydrastis canadensis (Hydrastis) (гидрастис канаденсис (гидрастис)) D4	22 мкл
Acidum sarcolacticum (ацидум сарколяктикум) D6	22 мкл
Hydrochinonum (гидрохинонум) D8	22 мкл
Acidum DL-alpha-liponicum (Acidum alpha-liponicum) (ацидум ДЛ-альфа-липоникум (ацидум альфа-липоникум)) D8	22 мкл
Sulfur (сульфур) D8	22 мкл
Manganum phosphoricum (манганум фосфорикум) D8	22 мкл
Natrium diethyloxalaceticum (Natriumdiethyloxalacetat) (натриум диэтилоксалацетикум (натриумдиэтилоксалацетат)) D8	22 мкл
Trichinoylum (трихиноилум) D10	22 мкл
Anthrachinonum (антрахинонум) D10	22 мкл
Naphthochinonum (нафтохинонум) D10	22 мкл
para-Benzoicum (пара-бензоикум) D10	22 мкл
Adenosinum triphosphoricum (аденозинум трифосфорикум) D10	22 мкл
Coenzym A (коэнзим А) D10	22 мкл
Galium aparine (галиум апарине) D6	22 мкл
Acidum acetylsalicylicum (ацидум ацетилосалициликум) D10	22 мкл
Histamine (Histaminum) (гистамин (гистаминум)) D10	22 мкл
Nadidum (надидум) D10	22 мкл

Magnesium gluconicum (магнeзиум глюконикум) D10	22 мкл
---	--------

Вспомогательные вещества: натрия хлорид (для установления изотонии), вода д/и.

2.2 мл (2.2 г) - ампулы бесцветного стекла (5) - упаковки ячейковые контурные пластиковые (1) - пачки картонные.

2.2 мл (2.2 г) - ампулы бесцветного стекла (5) - упаковки ячейковые контурные пластиковые (20) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гомеопатическое средство.

Показания к применению:

В комплексной терапии:

- хронических дегенеративных заболеваний внутренних органов и систем организма;
- интоксикационного синдрома (в том числе кахексия; инфекционные заболевания, сопровождающиеся лихорадочным состоянием);
- нарушений обмена веществ (в том числе атеросклероз, почечно- и желчнокаменная болезнь, подагра);
- абсолютного или относительного дефицита ферментов, витаминов;
- гипоксических состояний вследствие заболеваний, физического и психического стресса;
- последствий химио- и лучевой терапии.

Относится к болезням:

- [Атеросклероз](#)
- [Желчнокаменная болезнь](#)
- [Интоксикация](#)
- [Инфекции](#)
- [Кахексия](#)
- [Лихорадка](#)
- [Подагра](#)

Противопоказания:

- беременность, период лактации;
- возраст (до 18 лет, в связи с недостаточностью клинических данных);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат назначается взрослым внутримышечно по 1 ампуле 1-3 раза в неделю. Курс лечения 2-8 недель. Увеличение продолжительности курса лечения возможно по назначению врача.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

В этих случаях применение препарата следует прекратить и обратиться к врачу.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан во время беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания и меры предосторожности:

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу.

При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции, следует обратиться к врачу.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 18 лет.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте, при температуре от 15°C до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Ubihinon_Kompozitum