# Уголь активированный-УБФ



## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Активированный уголь

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Адсорбирующее средство. Обладает большой поверхностной активностью и высокой сорбционной способностью. Уменьшает всасывание из ЖКТ токсических веществ, солей тяжелых металлов, алкалоидов и гликозидов, лекарственных веществ, способствуя их выведению из организма. Адсорбирует на своей поверхности газы.

## Показания к применению:

Диспепсия, интоксикация при дизентерии, сальмонеллезе, пищевой токсикоинфекции, метеоризм, гиперсекреция соляной кислоты в желудке, аллергические заболевания, отравления химическими соединениями, лекарственными препаратами (в т.ч. алкалоидами, солями тяжелых металлов); для уменьшения газообразования при подготовке к рентгенологическим и эндоскопическим исследованиям.

## Относится к болезням:

- Аллергия
- Дизентерия
- Интоксикация
- Метеоризм
- Сальмонеллез
- Токсикоз

## Противопоказания:

Язвенные поражения ЖКТ, кровотечения из ЖКТ.

## Способ применения и дозы:

Внутрь по 250-750 мг 3-4 раза/сут. При использовании в качестве антидота - режим дозирования индивидуальный.

## Побочное действие:

*Возможно:* запор, диарея; при длительном применении - гиповитаминозы, нарушение всасывания из ЖКТ питательных веществ.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Уголь активированный обладает адсорбирующими свойствами и при одновременном приеме в высокой дозе с другими лекарственными препаратами способен существенно снижать их абсорбцию из ЖКТ, что приводит к уменьшению эффективности других лекарственных препаратов.

## Особые указания и меры предосторожности:

После приема угля активированного кал окрашивается в черный цвет.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Ugol_aktivirovannyy-UBF