

Ульцэп



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Раствор для в/в введения	1 мл
фракция полисахаридов, получаемая из свежих ростков картофеля	0.5 г

Вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода д/и.

1 мл - ампулы (3) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Обладает способностью активизировать регенераторно-репаративные процессы в слизистой оболочке ЖКТ.

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания к применению:

— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения.

Относится к болезням:

- [Язвенная болезнь](#)
- [Язвенная болезнь желудка](#)

Противопоказания:

— период беременности и лактации;
— детский возраст до 14 лет;
— гиперчувствительность к препарату.

Способ применения и дозы:

В/в по 1 мл раствора 0.5 мг/мл.

Разовая доза: 0.5 мг (1 инъекция) в 7 дней. Курс лечения составляет 3 инъекции в течение 14 дней.

Побочное действие:

Возможно появление кратковременного чувства жжения и боли в месте инъекции. Возможны аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 14 лет.

Условия хранения:

Хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте, при температуре от 2° до 10°C. Беречь от замерзания.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Ulcep>