Умкалор

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Раствор для приема внутрь*** прозрачный или слегка опалесцирующий, от светло-коричневого до красновато-коричневого цвета.

	100 г
жидкий экстракт корней пеларгонии сидовидной EPs 7630 (1:8-10)*	80 г

Вспомогательные вещества: глицерин 85% - 20 г.

* экстрагент: этанол 11% (масс/масс).

20 мл - флаконы темного стекла с капельницей (1) - пачки картонные.
50 мл - флаконы темного стекла с капельницей (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Оказывает противомикробное действие, обладает муколитическими свойствами. Способствует повышению неспецифической резистентности организма.

Фармакокинетика

Жидкий экстракт корней пеларгонии сидовидной содержит большое количество биологически активных веществ, которые в совокупности определяют его фармакологическую активность. Поэтому данные о фармакокинетике отдельных химических компонентов, входящих в состав экстракта, недостаточны для экстраполяции на препарат в целом.

Показания к применению:

— острые и хронические инфекционно-воспалительные заболевания дыхательных путей и ЛОР-органов (синусит, ринофарингит, тонзиллит, бронхит) - в составе комплексной терапии.

Относится к болезням:

- Инфекции
- Ринофарингит
- Синусит
- Тонзиллит

Противопоказания:

— предрасположенность к кровотечениям;

— тяжелые заболевания печени;

— тяжелые заболевания почек;

— беременность;

— период лактации (грудное вскармливание);

— детский возраст до 1 года (в связи с наличием в препарате этилового спирта);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует применять препарат при алкоголизме, черепно-мозговой травме, заболеваниях головного мозга, нарушении функции печени и почек (отсутствует опыт применения), у детей старше 1 года.

Способ применения и дозы:

Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 20-30 капель 3 раза/сут, **детям в возрасте от 6 до 12 лет** - по 10-20 капель 3 раза/сут, **детям от 1 года до 6 лет** - по 5-10 капель 3 раза/сут.

Препарат следует принимать за 30 мин до еды с небольшим количеством жидкости. При дозировании препарата флакон следует держать вертикально, при необходимости постукивая по дну флакона.

Средняя продолжительность курса лечения составляет 10 дней. После исчезновения симптомов заболевания рекомендуется продолжать лечение в течение нескольких дней для предотвращения рецидива.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: очень редко - тошнота, рвота, боли в эпигастральной области, диарея.

Прочие: возможны аллергические реакции.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Умкалор не сообщалось. Препарат обладает хорошей переносимостью.

Применение при беременности и кормлении грудью:

В связи с отсутствием до настоящего времени достаточных данных исследований препарат не рекомендуется применять при беременности и в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении Умкалора с антикоагулянтами (производными кумарина) возможно усиление их антикоагулянтного действия и возникновение кровотечений (кровотечение из носа, кровоточивость десен).

Особые указания и меры предосторожности:

В процессе хранения жидкие растительные экстракты имеют тенденцию к помутнению, однако, это не отражается на их фармакологической эффективности. Поскольку Умкалор является природным продуктом, возможны незначительные изменения цвета и вкуса препарата.

В связи с содержанием этанола (12%/об.) в препарате нужно учитывать, что максимальная разовая доза для детей старше 12 лет и взрослых содержит 0.125 г абсолютного этилового спирта, максимальная суточная доза для детей старше 12 лет и взрослых содержит 0.375 г абсолютного этилового спирта. Разовая доза для детей младше 12 лет содержит менее, чем 0.1 г абсолютного этилового спирта.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

При применении препарата следует соблюдать осторожность при занятии потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

При нарушениях функции почек

Противопоказан при тяжелых заболеваниях почек.

С *осторожностью* следует применять препарат при нарушении функции почек (отсутствует опыт применения).

При нарушениях функции печени

Противопоказан при тяжелых заболеваниях печени.

С *осторожностью* следует применять препарат при нарушении функции печени (отсутствует опыт применения).

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте до 1 года (в связи с наличием в препарате этилового спирта).

С *осторожностью* следует применять препарат у детей старше 1 года.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°С. После вскрытия флакона хранить не более 3 месяцев.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Umkalor