

## Ундевит



### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Поливитамины](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ <b>Драже</b>	<b>1 драже</b>
α-токоферола ацетат	10 мг
аскорбиновая кислота	75 мг
кальция пантотенат	3 мг
никотинамид	20 мг
пиридоксина гидрохлорид	3 мг
ретинола пальмитат	3300 МЕ (1.817 мг)
рибофлавин	2 мг
рутозид	10 мг
тиамина гидрохлорид	2 мг
фолиевая кислота	70 мкг
цианокобаламин	2 мкг

50 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

[1] - Инструкция по медицинскому применению одобрена фармакологическим комитетом МЗ РФ

Фармакологическое действие обусловлено свойствами витаминов, входящих в его состав. Основанием для сочетания в препарате Ундевит витаминов группы В с витаминами А, Е, С и Р является синергизм их физиологического действия на организм, при этом важно не только наличие тех или иных витаминов, но и их количественное соотношение.

### Показания к применению:

— гиповитаминозы;

## Ундевит

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

- для улучшения обмена веществ и общего состояния в пожилом и старческом возрасте;
- применение антибиотиков;
- период выздоровления после перенесенных заболеваний.

### Противопоказания:

- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* применять при тяжелых поражениях печени; язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

### Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь после еды.

С целью профилактики гиповитаминозов рекомендуется **взрослым** по 1 драже/сут.

При *тяжелых нагрузках, болезни, операции*, в **пожилом возрасте** рекомендуется по 2-3 драже/сут.

Курс лечения 20-30 дней. Перерывы между курсами 1-3 мес.

### Побочное действие:

*Возможны* аллергические реакции. Не превышать рекомендованную суточную дозу. При случайном приеме высоких доз следует немедленно обратиться к врачу.

### Особые указания и меры предосторожности:

Возможно окрашивание мочи в желтый цвет, что объясняется наличием в препарате рибофлавина. Не принимать одновременно с другими витаминными препаратами.

#### **При нарушениях функции печени**

С *осторожностью* применять при тяжелых поражениях печени.

#### **Применение в пожилом возрасте**

В **пожилом возрасте** рекомендуется по 2—3 драже/сут.

### Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте.

Срок годности — 1 г .

Не использовать по окончании срока годности, указанного на упаковке.

### Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Undevit>