Ундевит



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Поливитамины

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Драже***	**1 драже**
α-токоферола ацетат	10 мг
аскорбиновая кислота	75 мг
кальция пантотенат	3 мг
никотинамид	20 мг
пиридоксина гидрохлорид	3 мг
ретинола пальмитат	3300 МЕ (1.817 мг)
рибофлавин	2 мг
рутозид	10 мг
тиамина гидрохлорид	2 мг
фолиевая кислота	70 мкг
цианокобаламин	2 мкг

50 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

[I] - Инструкция по медицинскому применению одобрена фармакологическим комитетом МЗ РФ

Фармакологическое действие обусловлено свойствами витаминов, входящих в его состав. Основанием для сочетания в препарате Ундевит витаминов группы В с витаминами А, Е, С и Р является синергизм их физиологического действия на организм, при этом важно не только наличие тех или иных витаминов, но и их количественное соотношение.

Показания к применению:

— гиповитаминозы;

— для улучшения обмена веществ и общего состояния в пожилом и старческом возрасте;

— применение антибиотиков;

— период выздоровления после перенесенных заболеваний.

Противопоказания:

— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* применять при тяжелых поражениях печени; язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь после еды.

С целью *профилактики гиповитаминозов* рекомендуется **взрослым** по 1 драже/сут.

При *тяжелых нагрузках, болезни, операции*, в **пожилом возрасте** рекомендуется по 2-3 драже/сут.

Курс лечения 20-30 дней. Перерывы между курсами 1-3 мес.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции. Не превышать рекомендованную суточную дозу. При случайном приеме высоких доз следует немедленно обратиться к врачу.

Особые указания и меры предосторожности:

Возможно окрашивание мочи в желтыи цвет, что объясняется наличием в препарате рибофлавина. Не принимать одновременно с другими витаминными препаратами.

При нарушениях функции печени

С *осторожностью* применять при тяжелых поражениях печени.

Применение в пожилом возрасте

В **пожилом возрасте** рекомендуется по 2—3 драже/сут.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте.

Срок годности — 1 г .

Не использовать по окончании срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Undevit