Унгапивен



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство для наружного применения. Обладает местным раздражающим, противовоспалительным и вторичным анальгезирующим действием. Биологически активные вещества пчелиного яда оказывают общее резорбтивное действие, которое заключается в стимуляции эндокринной и иммунной систем.

Показания к применению:

Ревматизм, невралгии, артриты, артрозы, остеохондрозы, радикулиты, миалгии, миозиты, люмбаго.

Относится к болезням:

- Артрит
- Артроз
- Люмбаго
- Миалгия
- Невралгия
- Неврит
- Остеохондроз
- Радикулит

Противопоказания:

Выраженные нарушения функции печени и почек, туберкулез, новообразования, надпочечниковая недостаточность, сепсис и острые гнойные процессы, повышенная чувствительность к компонентам пчелиного яда.

Способ применения и дозы:

Применяют наружно. Наносят тонким слоем на кожу, предварительно протертую теплой водой (для улучшения всасывания), втирают в течение 2-3 мин 1-3 раза/сут. Курс лечения 1-4 нед.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции, реакции как местного (ощущение боли, жжения, гиперемия), так и общего характера (озноб, головная боль, тошнота, рвота, повышение температуры тела).

Применение при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью следует применять при беременности.

Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью следует применять у женщин во время менструации, у детей и лиц пожилого возраста.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при выраженных нарушениях функции печени.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при выраженных нарушениях функции почек.

Применение в пожилом возрасте

С осторожностью следует применять у лиц пожилого возраста.

Применение в детском возрасте

С осторожностью следует применять у детей.

Источник: http://drugs.thead.ru/Ungapiven