

[Унгапивен](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство для наружного применения. Обладает местным раздражающим, противовоспалительным и вторичным анальгезирующим действием. Биологически активные вещества пчелиного яда оказывают общее резорбтивное действие, которое заключается в стимуляции эндокринной и иммунной систем.

Показания к применению:

Ревматизм, невралгии, артриты, артрозы, остеохондрозы, радикулиты, миалгии, миозиты, люмбаго.

Относится к болезням:

- [Артрит](#)
- [Артроз](#)
- [Люмбаго](#)
- [Миалгия](#)
- [Невралгия](#)
- [Неврит](#)
- [Остеохондроз](#)
- [Радикулит](#)

Противопоказания:

Выраженные нарушения функции печени и почек, туберкулез, новообразования, надпочечниковая недостаточность, сепсис и острые гнойные процессы, повышенная чувствительность к компонентам пчелиного яда.

Способ применения и дозы:

Применяют наружно. Наносят тонким слоем на кожу, предварительно протертую теплой водой (для улучшения всасывания), втирают в течение 2-3 мин 1-3 раза/сут. Курс лечения 1-4 нед.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции, реакции как местного (ощущение боли, жжения, гиперемия), так и общего характера (озноб, головная боль, тошнота, рвота, повышение температуры тела).

Применение при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью следует применять при беременности.

Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью следует применять у женщин во время менструации, у детей и лиц пожилого возраста.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при выраженных нарушениях функции печени.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при выраженных нарушениях функции почек.

Применение в пожилом возрасте

С осторожностью следует применять у лиц пожилого возраста.

Применение в детском возрасте

С осторожностью следует применять у детей.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Ungapiven>