

## [Унгапивен](#)



### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакологические свойства:**

#### ***Фармакодинамика***

Средство для наружного применения. Обладает местным раздражающим, противовоспалительным и вторичным анальгезирующим действием. Биологически активные вещества пчелиного яда оказывают общее резорбтивное действие, которое заключается в стимуляции эндокринной и иммунной систем.

### **Показания к применению:**

Ревматизм, невралгии, артриты, артрозы, остеохондрозы, радикулиты, миалгии, миозиты, люмбаго.

### **Относится к болезням:**

- [Артрит](#)
- [Артроз](#)
- [Люмбаго](#)
- [Миалгия](#)
- [Невралгия](#)
- [Неврит](#)
- [Остеохондроз](#)
- [Радикулит](#)

### **Противопоказания:**

Выраженные нарушения функции печени и почек, туберкулез, новообразования, надпочечниковая недостаточность, сепсис и острые гнойные процессы, повышенная чувствительность к компонентам пчелиного яда.

### **Способ применения и дозы:**

Применяют наружно. Наносят тонким слоем на кожу, предварительно протертую теплой водой (для улучшения всасывания), втирают в течение 2-3 мин 1-3 раза/сут. Курс лечения 1-4 нед.

## **Побочное действие:**

*Возможно:* аллергические реакции, реакции как местного (ощущение боли, жжения, гиперемия), так и общего характера (озноб, головная боль, тошнота, рвота, повышение температуры тела).

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

С осторожностью следует применять при беременности.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

С осторожностью следует применять у женщин во время менструации, у детей и лиц пожилого возраста.

### ***При нарушениях функции почек***

Противопоказан при выраженных нарушениях функции печени.

### ***При нарушениях функции печени***

Противопоказан при выраженных нарушениях функции почек.

### ***Применение в пожилом возрасте***

С осторожностью следует применять у лиц пожилого возраста.

### ***Применение в детском возрасте***

С осторожностью следует применять у детей.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Ungapiven>