

Унитиол-Бинергия



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Раствор для в/м и п/к введения прозрачный, бесцветный или розоватого цвета со слабым запахом сероводорода.

	1 мл
димеркаптопропансульфонат натрия моногидрат (унитиол)	50 мг

Вспомогательные вещества: вода д/и до 1 мл.

- 5 мл - ампулы стеклянные (5) - упаковки контурные пластиковые (1) - пачки картонные.
- 5 мл - ампулы стеклянные (5) - упаковки контурные пластиковые (2) - пачки картонные.
- 5 мл - ампулы стеклянные (5) - упаковки контурные ячейковые (1) - пачки картонные.
- 5 мл - ампулы стеклянные (5) - упаковки контурные ячейковые (2) - пачки картонные.
- 5 мл - ампулы стеклянные (5) в комплекте с ножом ампульным или скарификатором ампульным - упаковки контурные пластиковые (1) - пачки картонные.
- 5 мл - ампулы стеклянные (5) в комплекте с ножом ампульным или скарификатором ампульным - упаковки контурные пластиковые (2) - пачки картонные.
- 5 мл - ампулы стеклянные (5) в комплекте с ножом ампульным или скарификатором ампульным - упаковки контурные ячейковые (1) - пачки картонные.
- 5 мл - ампулы стеклянные (5) в комплекте с ножом ампульным или скарификатором ампульным - упаковки контурные ячейковые (2) - пачки картонные.
- 5 мл - ампулы стеклянные (5) - упаковки контурные пластиковые (25) - коробки картонные.
- 5 мл - ампулы стеклянные (5) - упаковки контурные пластиковые (50) - коробки картонные.
- 5 мл - ампулы стеклянные (5) - упаковки контурные пластиковые (100) - коробки картонные.
- 5 мл - ампулы стеклянные (5) - упаковки контурные ячейковые (25) - коробки картонные.
- 5 мл - ампулы стеклянные (5) - упаковки контурные ячейковые (50) - коробки картонные.
- 5 мл - ампулы стеклянные (5) - упаковки контурные ячейковые (100) - коробки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комплексообразующее средство, оказывает дезинтоксикационное действие. Активные сульфгидрильные группы, взаимодействуя с тиоловыми ядами и образуя с ними нетоксичные соединения, восстанавливают функции ферментных систем организма, пораженных ядом. Увеличивает выведение некоторых катионов (особенно Cu^{2+} и Zn^{2+}) из метал-лосодержащих ферментов клеток.

При диабетической полиневропатии уменьшает ирритативный болевой синдром, улучшает состояние периферической нервной системы и нормализует проницаемость капилляров.

Фармакокинетика

При парентеральном введении быстро всасывается в кровь. C_{max} в плазме крови достигается через 15-30 мин после в/м инъекции. $T_{1/2}$ - 1-2 ч. Экскретируется почками, преимущественно в виде продуктов неполного или частичного окисления, частично - в неизмененном виде.

Показания к применению:

- интоксикация мышьяком, ртутью, висмутом, хромом и сердечными гликозидами;
- гепато-церебральная дистрофия (болезнь Вильсона-Вестфала-Коновалова);
- диабетическая полиневропатия;
- хронический алкоголизм (в составе комплексной терапии);
- делириозный психоз.

Относится к болезням:

- [Алкоголизм](#)
- [Гепатит](#)
- [Гепатоз](#)
- [Интоксикация](#)
- [Полиневропатия](#)

Противопоказания:

- печеночная недостаточность;
- артериальная гипертензия;
- беременность;
- период лактации;
- детский возраст до 18 лет;
- повышенная чувствительность.

Способ применения и дозы:

В/м, п/к.

При *интоксикации мышьяком* - 250-500 мг (5-10 мл препарата), из расчета 50 мг/10 кг, в 1-е сут - 3-4 раза, во 2-ые сут - 2-3 раза, в последующие - по 1-2 раза.

При *отравлениях соединениями ртути* - по той же схеме в течение 6-7 сут. Лечение проводят до исчезновения признаков интоксикации.

При *дигиталисной интоксикации* в первые 2 дня вводят 250-500 мг (5-10 мл препарата) 3-4 раз/сут, затем 1-2 раза/сут до прекращения кардиотоксического действия.

При *гепатоцеребральной дистрофии* - в/м 250-500 мг (5-10 мл препарата) ежедневно или через день; курс лечения - 25-30 инъекций; при необходимости повторяют через 3-4 мес.

При *хроническом алкоголизме* назначают 150-250 мг (3-5 мл препарата) 2-3 раза в неделю.

Для *купирования делирия* - однократно 200-250 мг (4-5 мл препарата).

При *диабетической полиневропатии* - в/м, по 250 мг (5 мл препарата), курс лечения - 10 инъекций.

Побочное действие:

Тошнота, рвота, головокружение, тахикардия, бледность кожных покровов, повышение АД, беспокойство.

Передозировка:

В рекомендуемых дозах и по показаниям явлений передозировки не возникает.

При превышении рекомендуемой терапевтической дозы в 10 раз наблюдаются одышка, гиперкинезы, заторможенность, вялость, оглушенность, кратковременные судороги.

Лечение: симптоматическая терапия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано применение при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не рекомендуется одновременное применение Унитиола с препаратами, в состав которых входят тяжелые металлы и щелочи, так как происходит быстрое разложение Унитиола.

Особые указания и меры предосторожности:

При острых отравлениях проводят дополнительные лечебные мероприятия (промывание желудка, оксигенотерапия, введение декстрозы и др).

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Данных, подтверждающих влияние препарата Унитиол-Бинергия на способность заниматься потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания, нет.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при печеночной недостаточности.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 18 лет.

Условия хранения:

Хранить препарат в защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Unitiol-Binergiya>