Уралит-У



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Калия натрия гидроцитрат

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Соль щелочных металлов и слабой кислоты, выделяясь с мочой, сдвигает pH мочи в щелочную сторону (до 6.2-7.5), что обусловливает повышение степени диссоциации и растворимости мочевой кислоты и цистина.

Показания к применению:

— профилактика и лечение нефроуролитиаза (мочекислые камни, уратурия, цистиновые камни; цистинурия);

— необходимость подщелачивания мочи (поздняя порфирия, лечение цитостатиками, подагра).

Относится к болезням:

- Нефрит
- Подагра
- Порфирия
- Цистиноз
- Цистинурия
- Цистит

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— острая почечная недостаточность;

— острая сердечная недостаточность;

— диета с резким ограничением потребления поваренной соли;

— тяжелый метаболический алкалоз;

— инфицированность мочевыводящих путей бактериями, расщепляющими мочевину;

— pH мочи выше 7.

Способ применения и дозы:

Внутрь, после еды.

Суточная доза (10 г) в 3 приема: утром и после обеда - по 2.5 г (по 1 мерной ложке), вечером - 5 г (по 2 мерных ложки). Указанная доза должна обеспечить повышение pH свежей мочи (выделенной непосредственно перед приемом очередной дозы) до следующих значений: при *мочекислых камнях* - 6.2-6.8; при *цистиновых камнях* - 7.5-8.5; при *цитостатической терапии* - не менее 7; при *поздней порфирии кожи* - 7.2-7.5.

При необходимости суточную дозу повышают, добавляя 0.5 ложки гранул к вечерней дозе, либо уменьшают, снижая вечернюю дозу. Длительность терапии - 1-6 мес.

Побочное действие:

Диспепсия; фосфатный нефроуролитиаз.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Сочетанное назначение с лекарственными средствами, содержащими цитрат и ион алюминия, может вызвать повышенную резорбцию алюминия. Принимать последние необходимо с интервалом не менее 2 ч.

Особые указания и меры предосторожности:

Следует учитывать, что средняя суточная доза препарата содержит 1.72 г (44 ммоль) ионов калия, 1 г (44 ммоль) ионов натрия.

В процессе лечения препаратом больной должен заносить в дневник количество употребляемых мерных ложек гранулята и показатели pH мочи, собранной непосредственно перед приемом препарата.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при острой почечной недостаточности.

Источник: http://drugs.thead.ru/Uralit-U