

Урифлорин



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Толокнянки обыкновенной листья](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)
- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство растительного происхождения. Комплекс биологически активных веществ листьев толокнянки обладает мочегонным, противовоспалительным и противомикробным действием. Из фенольных гликозидов толокнянки - арбутина и метиларбутина под действием фермента арбутазы высвобождается гидрохинон. Выделяясь с мочой, гидрохинон усиливает мочеотделение и оказывает противомикробное действие. Противовоспалительные свойства толокнянки обусловлены высоким содержанием дубильных веществ.

Показания к применению:

Воспалительные заболевания мочевого пузыря и мочевыводящих путей.

Противопоказания:

Беременность, лактация, детский возраст до 12 лет, повышенная чувствительность к толокнянке.

Способ применения и дозы:

Принимают внутрь в виде приготовленного отвара (10 г сырья на 200 мл воды) по 1/3-1/2 стакана 3-5 раз/сут.

Побочное действие:

Урифлорин

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

При приеме в *высоких дозах и длительном применении*: тошнота, рвота, диарея, обострение воспалительного процесса в мочевыводящих путях.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности, в период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

Приготовленный отвар хранить в прохладном месте не более 2 сут.

Препараты толокнянки обыкновенной не следует применять одновременно со средствами, закисляющими мочу.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте до 12 лет.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Uriflorin>