

Уро-Ваксом



Код АТХ:

- [L03AX](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Escherichia coli](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Капсулы твердые желатиновые, размер №3, с оранжевой непрозрачной крышечкой и желтым непрозрачным корпусом; содержимое капсул - порошок от светло-желтого до светло-коричневого цвета.

| | |
|--|----------------|
| | 1 капс. |
| лиофилизированный лизат бактерий <i>Escherichia coli</i> | 6 мг |

Вспомогательные вещества: пропилгаллат (безводный) - 0.084 мг, натрия глутамат (безводный) - 3.03 мг, маннитол - до 60 мг, крахмал прежелатинизированный - 77 мг, магния стеарат - 3 мг, маннитол - до 200 мг.

Состав оболочки капсулы: железа оксид красный (E172) - 0.01 мг, железа оксид желтый (E172) - 0.21 мг, титана диоксид (E171) - 0.87 мг, желатин - до 50 мг.

10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Иммуностропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Уро-Ваксом обладает следующими эффектами:

- стимулирует Т-лимфоциты;
- индуцирует образование эндогенного интерферона;
- увеличивает содержание IgA, в т.ч. в моче.

Уро-Ваксом уменьшает частоту рецидивов инфекций мочевого тракта, особенно циститов.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Уро-Ваксом не предоставлены.

Показания к применению:

— комбинированное лечение и профилактика рецидивов хронической инфекции мочевых путей, особенно циститов, независимо от природы микроорганизма, в сочетании с антибиотиками или другими противомикробными средствами у взрослых и детей старше 4 лет.

Относится к болезням:

- [Инфекции](#)
- [Цистит](#)

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

В *лечебных целях* назначают по 1 капс. ежедневно утром натощак в качестве дополнительного лекарственного средства при проведении обычной противомикробной терапии до исчезновения симптомов, но не менее 10 дней. Максимальный срок лечения 3 месяца.

Для *профилактики рецидивов хронической инфекции мочевого тракта* назначают по 1 капс. ежедневно утром натощак в течение 3 месяцев.

В случае если ребенку трудно проглотить капсулу, ее следует открыть и смешать содержимое с питьем (фруктовый сок, молоко и т.д.).

Длительность лечения или назначение повторного курса терапии определяется индивидуально, исходя из общего состояния пациента.

Побочное действие:

Общая частота нежелательных явлений в клинических исследованиях составляла около 4%.

Ниже приводятся зарегистрированные побочные эффекты в зависимости от частоты их возникновения.

Со стороны пищеварительной системы: часто (от 1 до 10%) - диарея, тошнота, диспепсия, в т.ч. ощущение дискомфорта в эпигастральной области; нечасто (от 0.1 до 1%) - боль в животе.

Со стороны нервной системы: часто (от 1 до 10%) - головная боль.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: нечасто (от 0.1 до 1%) - аллергические реакции (сыпь, зуд, невыраженная экзантема).

Нарушения общего характера: нечасто (от 0.1 до 1%) - лихорадка.

Зарегистрированы единичные случаи серьезных негативных явлений, таких как отек полости рта и периферические отеки, а также развитие алопеции. При появлении кожных реакций, лихорадки (в случае изолированной или необъяснимой лихорадки (выше 38°C) возникающей в начале лечения) или отека лечение следует прекратить, так как данные симптомы могут быть признаками аллергической реакции.

Передозировка:

Сведения о случаях передозировки отсутствуют.

Природа Уро-Ваксома и результаты изучения его токсичности на животных указывают на то, что передозировка маловероятна.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Клинические исследования применения Уро-Ваксома при беременности не проводились.

Исследования на животных не выявили отрицательного воздействия на течение беременности, развитие эмбриона, плода и/или постнатальное развитие.

В отношении возможности применения препарата в период грудного вскармливания специальные исследования не проводились и сведений по данному вопросу до настоящего времени не имеется.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Взаимодействия с другими лекарственными препаратами до настоящего времени не установлено.

В качестве меры предосторожности не следует применять препарат за 2 недели до и в течение 2-х недель после приема внутрь живых вакцин.

Иммунодепрессивные препараты могут оказывать влияние на действие препарата.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Уро-Ваксом не влияет на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

Применение в детском возрасте

Назначают по показаниям детям старше 4 лет

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°С.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Uro-Vaksom>