Уролесан



Код АТХ:

• G04BC

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Душицы обыкновенной травы экстракт
- Клещевины обыкновенной семян масло
- Моркови дикой семян экстракт
- Мяты перечной листьев масло
- Пихты масло
- Хмеля соплодия

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр^{МНН МНН МНН МНН МНН В} Википедия МНН МНН МНН МНН МНН МНН РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com

Форма выпуска:

🛇 **Капли для приема внутрь** от зеленовато-коричневого до коричневого цвета, с характерным запахом мяты.

	100 мл
масло пихты	6.76 г
масло мяты перечной	1.69 г
масло касторовое	9.295 г
жидкий экстракт семян моркови дикой	19.435 г
жидкий экстракт шишек хмеля	27.88 г
жидкий экстракт травы душицы	19.295 г

Вспомогательные вещества: натрия эдетат (трилон Б) 4 мг.

25 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) в комплекте с пробкой-капельницей - пачки.

25 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) - пачки.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Фитопрепарат комбинированного состава. Оказывает спазмолитическое, противовоспалительное, противомикробное действие, усиливает желчеобразование и желчевыделение, повышает диурез, изменяет pH мочи в кислую сторону, увеличивает выделение мочевины и хлоридов.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Уролесан не предоставлены.

Показания к применению:

_	мочекаменная	болезнь:

- пиелонефрит;
- желчнокаменная болезнь;
- холецистит;
- дискинезия желчевыводящих путей по гиперкинетическому типу.

Относится к болезням:

- Дискинезия желчевыводящих путей
- Желчнокаменная болезнь
- Мочекаменная болезнь
- Пиелит
- Пиелонефрит
- Холера
- Холецистит

Противопоказания:

_	M3X	KOI	-a:

— тошнота;

— диарея;

— возраст до 18 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует применять препарат при заболеваниях печени, алкоголизме, черепно-мозговой травме, заболеваниях головного мозга.

Способ применения и дозы:

Препарат следует принимать внутрь по 8-10 капель на кусочке сахара 3 раза/сут до еды.

Длительность курса лечения зависит от тяжести заболевания и составляет от 5 до 30 дней.

При почечных и печеночных коликах разовая доза может быть повышена до 15-20 капель.

Увеличение разовой дозы, длительности и проведение повторного курса лечения возможно только по рекомендации врача.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, диарея, изжога.

Прочие: аллергические реакции, головокружение.

Передозировка:

Симптомы: возможно усиления побочных эффектов (головокружение, тошнота).

Лечение: проводят симптоматическую терапию.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания в связи с отсутствием специальных исследований.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Взаимодействие с другими лекарственными средствами не известно.

Особые указания и меры предосторожности:

Не следует применять препарат Уролесан, если диаметр камней в почках превышает 3 мм.

Препарат содержит 60% этилового спирта. В максимальной разовой дозе препарата содержание этилового спирта составляет 0.6 мл. В максимальной суточной дозе препарата содержание этилового спирта составляет 1.8 мл.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

При приеме в рекомендуемых дозах препарат не оказывает влияние на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций.

При нарушениях функции печени

С осторожностью следует применять препарат при заболеваниях печени.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском и подростковом возрасте до 18 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 20°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Urolesan