Уролесан-М



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капли для приема внутрь*** от зеленовато-коричневого до коричневого цвета, с характерным запахом мяты.

	100 мл
масло пихты	6.76 г
масло мяты перечной	1.69 г
масло касторовое	9.295 г
жидкий экстракт семян моркови дикой	19.435 г
жидкий экстракт шишек хмеля	27.88 г
жидкий экстракт травы душицы обыкновенной	19.295 г

Вспомогательные вещества: натрия эдетат (трилон Б) 4 мг.

25 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) в комплекте с пробкой-капельницей - пачки.
25 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) - пачки.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения. Составляющие препарата Уролесан-М уменьшают воспалительные явления в мочевыводящих путях и почках, способствуют усиленному кровоснабжению почек и печени, оказывают диуретическое, антибактериальное, желчегонное действие, образуют защитный коллоид в моче и нормализуют тонус гладкой мускулатуры верхних мочевых путей и желчного пузыря.

Уролесан-М увеличивает выделение мочевины и хлоридов, способствует выведению мелких конкрементов и песка из мочевого пузыря и почек.

Фармакокинетика

Препарат хорошо всасывается, действие его начинается через 20-30 мин и продолжается 4-5 ч. Максимальный эффект наступает через 1-2 ч. Выводится через ЖКТ и почками.

Показания к применению:

— мочекаменная и желчнокаменная болезнь;

— пиелонефрит;

— холецистит;

— дискинезия желчевыводящих путей.

Относится к болезням:

- Дискинезия желчевыводящих путей
- Желчнокаменная болезнь
- Холера
- Холецистит

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата;

— гастриты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

— возраст до 6 лет.

Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь до еды.

Рекомендуемые дозы для **взрослых**: по 1 чайной ложке (5 мл) сиропа 3 раза в сутки до еды.

При *острых состояниях (в т.ч. при почечной и печеночной коликах)* продолжительность курса терапии составляет от 5 до 7 дней, при *хронических состояниях* - от 7 дней до 1 месяца. При возникновении почечной и печеночной колик разовую дозу можно повысить до 2-х чайных ложек (10 мл), затем на последующий прием вернуться к обычной разовой дозе (5 мл).

Рекомендуемые дозы для **детей**: **6-7 лет** - по 2-4 мл 3 раза в сутки; **7-14 лет** - по 4-5 мл 3 раза в сутки. Дозировка проводится с помощью шприца-дозатора.

Побочное действие:

Аллергические реакции, тошнота, головокружение, диарея, изжога.

Передозировка:

Симптомы: тошнота, головокружение.

Лечение: обильное теплое питье, покой, активированный уголь, атропина сульфат (0,0005-0,001 г).

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания в связи с отсутствием данных о безопасности применения препарата у данной категории пациентов.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не изучено.

Особые указания и меры предосторожности:

Не применять препарат в случае, если диаметр камней превышает 3 мм.

Пациентам с сахарным диабетом, а также пациентам с повышенным содержанием глюкозы в плазме крови

необходимо быть острожными, применяя Уролесан®-М (в состав препарата входит сахарный сироп). Разовая доза препарата (5 мл) содержит 0,38 углеводных единиц (4,5865 г сахарозы).

Влияние на способность управлять автотранспортом и работать с механизмами

В период применения препарата следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

При нарушениях функции почек

Показан при мочекаменной болезни и пиелонефрите.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 6 лет.

Условия хранения:

Хранить в защищенном от света месте при температуре от 8 °С до 15°С. После вскрытия хранить не более 28 суток при температуре от 8°С до 15°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Urolesan-M