Уролесан (капсулы)



Код АТХ:

G04BC

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Душицы обыкновенной травы экстракт
- Клещевины обыкновенной семян масло
- Моркови дикой семян экстракт
- Мяты перечной листьев масло
- Пихты масло
- Хмеля соплодия

Полезные ссылки:

Форма выпуска:

Капсулы твердые желатиновые №0, корпус и крышечка зеленого цвета; содержимое капсулы - порошок от желтосерого до серо-коричневого цвета с зеленоватым оттенком с вкраплениями и характерным запахом.

еерого до серо кори тевого цвета с зеленоватым оттепком с вкраплениями и характерным запахом.	
	1 капс.
уролесан экстракт густой, в перерасчете на содержание	10.7 мг, в т. ч
влаги 10%	
экстракт семян моркови дикой	1.84 мг
экстракт шишек хмеля	6.33 мг
экстракт травы душицы обыкновенной	1.46 мг
масло мяты перечной листьев	7.46 мг
масло пихты	25.5 мг

Вспомогательные вещества: магния гидроксикарбонат 131.96 мг, лактозы моногидрат 50.1 мг, масло касторовое 35.15 мг, магния алюминометасиликат 27.11 мг, тальк 6.38 мг, крахмал картофельный 5.62 мг, динатрия эдетата дигидрат 0.02 мг.

Состав капсулы: краситель хинолиновый желтый 0.96 мг, титана диоксид 0.77 мг, краситель железа оксид желтый 0.29 мг, краситель синий патентованный 0.15 мг, желатин до 96 мг.

10 шт. - блистеры Ал/ПВХ (4) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат оказывает спазмолитическое, противовоспалительное, антисептическое действие, усиливает желчеобразование и желчевыделение, повышает диурез, подкисляет мочу, увеличивает выделение мочевины и хлоридов.

Фармакокинетика

Уролесан является комплексом биологически активных компонентов, в связи с этим проведение его фармакокинетических исследований не представляется возможным.

Показания к применению:

- в комплексной терапии острых и хронических инфекций мочевыводящих путей и почек (цистит, пиелонефрит);
- мочекаменная болезнь;
- желчнокаменная болезнь;
- хронический холецистит;
- дискинезия желчевыводящих путей по гиперкинетическому типу.

Относится к болезням:

- Дискинезия желчевыводящих путей
- Желчнокаменная болезнь
- Инфекции
- Инфекции мочевыводящих путей
- Мочекаменная болезнь
- Пиелит
- Пиелонефрит
- Холера
- Холецистит

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактазная мальабсорбция;
- гиперацидный гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- диаметр камней в почках превышает 3 мм;
- возраст до 18 лет.

Способ применения и дозы:

Препарат применяют внутрь, до еды, по 1 капсуле 3 раза в день. При возникновении почечных и печеночных колик разовую дозу можно однократно повысить до 2-х капсул, затем на последующих приемах вернуться к обычной разовой дозе (1 капсула). Капсулы следует принимать, не разжевывая, запивая небольшим количеством воды.

При острых состояниях (в том числе при почечной и печеночных коликах) продолжительность курса терапии составляет от 5 до 7 дней, при хронических состояниях - до 1 месяца. Увеличение длительности и проведение повторного курса лечения возможно только по рекомендации врача.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: диспепсические явления (изжога, тошнота, рвота, диарея);

Аллергические реакции: зуд, покраснение лица, кожная сыпь, ангионевротический отек (чувство першения в горле, затруднение дыхания, отек лица, языка);

Со стороны центральной и периферической нервной системы: головокружение, общая слабость;

Со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение/понижение АД.

Передозировка:

Возможно усиление дозозависимых побочных эффектов (в том числе тошнота, рвота, головокружение).

Лечение симптоматическое: обильное теплое питье, покой, активированный уголь, атропина сульфат $(0,0005-0,001 \, \Gamma)$.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано (эффективность и безопасность не изучались).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Перед применением препарата следует проконсультироваться с врачом! При возникновении острых состояний следует немедленно обратиться к врачу!

При хронических состояниях в случае отсутствия эффекта на фоне приема препарата в течение 5-7 дней следует обратиться к врачу.

В случае появления побочных эффектов или нежелательных реакций, не указанных в инструкции, следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В случае возникновения побочных реакций со стороны нервной системы (головокружение) пациентам следует воздержаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

При нарушениях функции почек

Противопоказан при диаметре камней в почках превышающих 3 мм.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 18 лет.

Условия хранения:

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Urolesan_kapsuly