



10 шт. - блистеры Ал/ПВХ (4) - пачки картонные.

## Фармакологические свойства:

### Фармакодинамика

Препарат оказывает спазмолитическое, противовоспалительное, антисептическое действие, усиливает желчеобразование и желчевыделение, повышает диурез, подкисляет мочу, увеличивает выделение мочевины и хлоридов.

### Фармакокинетика

Уролесан является комплексом биологически активных компонентов, в связи с этим проведение его фармакокинетических исследований не представляется возможным.

## Показания к применению:

- в комплексной терапии острых и хронических инфекций мочевыводящих путей и почек (цистит, пиелонефрит);
- мочекаменная болезнь;
- желчнокаменная болезнь;
- хронический холецистит;
- дискинезия желчевыводящих путей по гиперкинетическому типу.

## Относится к болезням:

- [Дискинезия желчевыводящих путей](#)
- [Желчнокаменная болезнь](#)
- [Инфекции](#)
- [Инфекции мочевыводящих путей](#)
- [Мочекаменная болезнь](#)
- [Пиелит](#)
- [Пиелонефрит](#)
- [Холера](#)
- [Холецистит](#)

## Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактазная мальабсорбция;
- гиперацидный гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- диаметр камней в почках превышает 3 мм;
- возраст до 18 лет.

## Способ применения и дозы:

Препарат применяют внутрь, до еды, по 1 капсуле 3 раза в день. При возникновении почечных и печеночных колик разовую дозу можно однократно повысить до 2-х капсул, затем на последующих приемах вернуться к обычной разовой дозе (1 капсула). Капсулы следует принимать, не разжевывая, запивая небольшим количеством воды.

При острых состояниях (в том числе при почечной и печеночных коликах) продолжительность курса терапии составляет от 5 до 7 дней, при хронических состояниях - до 1 месяца. Увеличение длительности и проведение повторного курса лечения возможно только по рекомендации врача.

## **Побочное действие:**

*Со стороны пищеварительной системы:* диспепсические явления (изжога, тошнота, рвота, диарея);

*Аллергические реакции:* зуд, покраснение лица, кожная сыпь, ангионевротический отек (чувство першения в горле, затруднение дыхания, отек лица, языка);

*Со стороны центральной и периферической нервной системы:* головокружение, общая слабость;

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:* повышение/понижение АД.

## **Передозировка:**

Возможно усиление дозозависимых побочных эффектов (в том числе тошнота, рвота, головокружение).

*Лечение* симптоматическое: обильное теплое питье, покой, активированный уголь, атропина сульфат (0,0005-0,001 г).

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано (эффективность и безопасность не изучались).

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Не описано.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Перед применением препарата следует проконсультироваться с врачом! При возникновении острых состояний следует немедленно обратиться к врачу!

При хронических состояниях в случае отсутствия эффекта на фоне приема препарата в течение 5-7 дней следует обратиться к врачу.

В случае появления побочных эффектов или нежелательных реакций, не указанных в инструкции, следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

*Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами*

В случае возникновения побочных реакций со стороны нервной системы (головокружение) пациентам следует воздержаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

### **При нарушениях функции почек**

Противопоказан при диаметре камней в почках превышающих 3 мм.

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказан детям до 18 лет.

## **Условия хранения:**

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

## **Срок годности:**

2 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Urolesan\\_kapsuly](http://drugs.thead.ru/Urolesan_kapsuly)