Уропрост-Д

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◊ ***Суппозитории ректальные*** полупрозрачные с возможной мраморностью, почти бесцветные или с желтоватым или сероватым оттенком цвета, торпедообразной формы; допускается незначительное размягчение поверхностного слоя и "подпотевание" контурной ячейковой упаковки; допускается наличие воздушного стержня или воронкообразного углубления.

	1 супп.
экстракт простаты	30 мг,
что соответствует содержанию водорастворимых пептидов	6 мг

Вспомогательные вещества: диметилсульфоксид - 90 мг, макрогол 1500 (полиэтиленоксид 1500) - 2180 мг.

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Лекарственное средство животного происхождения. Обладает органотропным действием на предстательную железу. Уменьшает степень отека, лейкоцитарной инфильтрации предстательной железы, нормализует секреторную функцию эпителиальных клеток, увеличивает число лецитиновых зерен в секрете ацинусов, стимулирует мышечный тонус мочевого пузыря. Уменьшает тромбообразование, обладает антиагрегантной активностью, препятствует развитию тромбоза венул в предстательной железе. Нормализует параметры предстательной железы и эякулята. Уменьшает боль и дискомфорт, устраняет дизурические явления, улучшает копулятивную функцию.

Уулучшает микроциркуляцию крови в стенке мочевого пузыря за счет расширения неповрежденных сосудов (эффект вазодилатации), что способствует восстановлению доставки кислорода в ткани, находящиеся в состоянии гипоксии; это стимулирует физиологическую репарацию. Оказывает противовоспалительное действие за счет улучшения процессов трофики стенки мочевого пузыря и стимуляции регенераторных процессов. Активация органного кровотока способствует улучшению адаптационной и сократительной активности детрузора, увеличивая емкость мочевого пузыря. Уменьшением ишемии детрузора можно объяснить выраженное снижение гиперактивности мочевого пузыря, которое продолжается и после окончания применения препарата, содержащего экстракт простаты.

Фармакокинетика

Как пептидное вещество, расщепляется клеточными протеазами до аминокислот. Не обладает кумулятивным действием.

Показания к применению:

Хронический простатит; доброкачественная гиперплазия предстательной железы; состояния до и после оперативных вмешательств на предстательной железе.

Лечение ургентного недержания мочи, ургентных позывов к мочеиспусканию и учащенного мочеиспускания при неосложненных формах гиперактивности мочевого пузыря у женщин в климактерическом и постклимактерическом периодах.

Относится к болезням:

- Гиперплазия предстательной железы
- Простатит

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к активному веществу; возраст до 18 лет.

Способ применения и дозы:

Внутрь, ректально, в/м. Доза и частота применения зависит от показаний и применяемой лекарственной формы.

Побочное действие:

Аллергические реакции: очень редко - крапивница.

При ректальном применении: часто - зуд заднего прохода; нечасто - диарея, метеоризм.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Диагнозы

- Баланит, баланопостит, фимоз
- Варикоцеле
- Гидронефроз
- Гломерулонефрит

Особые указания и меры предосторожности:

Препараты, содержащие экстракт предстательной железы, не являются взаимозаменяемыми, поэтому следует строго соблюдать показания к применению для каждого из них.

До начала лечения хронического простатита и, при необходимости, в процессе лечения рекомендуется проводить анализ секрета предстательной железы.

В период применения препарата для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы следует регулярно проводить стандартный контроль данного заболевания. Перед началом лечения необходимо убедиться, что патология носит доброкачественный характер.

Источник: http://drugs.thead.ru/Uroprost-D