

## Уропрост (свечи)



### **Код АТХ:**

- [G04BX](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Простаты экстракт](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

#### *Форма выпуска, описание и состав*

↓ <b>Суппозитории ректальные</b>	<b>1 супп.</b>
экстракт простаты крупного рогатого скота	50 мг

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Органотропные средства](#)

### **Показания к применению:**

- хронический простатит;
- состояние до и после операций на предстательной железе;
- доброкачественная гиперплазия предстательной железы.

### **Относится к болезням:**

- [Гиперплазия предстательной железы](#)
- [Простатит](#)

### **Противопоказания:**

- индивидуальная непереносимость (в т.ч. гиперчувствительность в анамнезе).

## **Способ применения и дозы:**

Препарат применяют ректально. Освободив суппозиторий от контурной упаковки, вводят его в задний проход после дефекации или очистительной клизмы.

Применяют по 1 суппозиторию 1 раз в день.

После введения препарата желательно пребывание больного в постели в течение 30-40 мин. Длительность лечения - 20 дней.

По показаниям возможны повторные курсы; рекомендуется проводить не ранее, чем через 2-4 недели.

## **Побочное действие:**

Особенности технологии выделения этих пептидов нивелируют их молекулярную видоспецифичность, в результате чего полученные препараты лишаются антигенных свойств и ассоциированных с ними побочных эффектов.

Часто - 1-10 %; иногда - 0,1-1 %; редко - 0,01-0,1 %; очень редко - менее 0,01 %, включая отдельные случаи.

Очень редко - аллергические реакции, часто - зуд в заднем проходе, иногда - диарея, метеоризм.

## **Передозировка:**

В настоящее время случаи передозировки не отмечались.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Не применяется у женщин.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Отрицательного взаимодействия не отмечалось. Препарат может использоваться при комплексной терапии.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Лечение хронического простатита должно быть комплексным, предполагающим применение различных групп лекарственных препаратов и немедикаментозных методов лечения. При лечении рекомендуется проводить анализ секрета предстательной железы.

## **Условия хранения:**

В защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Беречь от детей.

## **Срок годности:**

2 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Uroprost\\_svechi](http://drugs.thead.ru/Uroprost_svechi)