

[Успокоительный сбор №2](#)



Код АТХ:

- [N05CX](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Валерианы лекарственной корневища с корнями](#)
- [Мяты перечной листья](#)
- [Пустырника трава](#)
- [Солодки корни](#)
- [Хмеля соплодия](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{мнн мнн мнн мнн мнн} [Википедия](#)^{мнн мнн мнн мнн мнн}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Седативное средство растительного происхождения.

Настой сбора обладает успокаивающим и умеренным спазмолитическим эффектом.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии:

- повышенная возбудимость;
- нарушения сна;
- артериальная гипертензия (начальная стадия).

Относится к болезням:

- [Гипертензия](#)

Противопоказания:

— гиперчувствительность.

Способ применения и дозы:

Измельченное сырье: 10 г (3 ст.ложки) сбора помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, накрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 мин, охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят водой до 200 мл.

Принимают внутрь в теплом виде по 1/3 стакана 2 раза/сут за 20-30 мин до еды в течение 2-4 нед.

Сбор-порошок: 1 фильтр-пакет (2 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипятка, накрывают и настаивают в течение 30 мин. Затем фильтр-пакет отжимают, объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 100 мл.

Принимают внутрь в теплом виде по 1/2 стакана 2 раза/сут за 20-30 мин до еды в течение 2-4 нед.

Повторение курса лечения возможно только по рекомендации врача.

Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие:

Аллергические реакции.

Передозировка:

При длительном применении в дозах, превышающих рекомендованные - мышечная слабость, сонливость, снижение работоспособности.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Усиливает действие снотворных и других лекарственных средств, угнетающих ЦНС.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Uspokoitelnyy_sbor_no2