

[Узара](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Сироп** прозрачный до опалесцирующего, от желтоватого до коричневатого цвета, с характерным запахом.

	1 мл
сухой экстракт корня узары (4.5-6.2:1)	7.56 мг

Вспомогательные вещества: пропиленгликоль, макроголглицерола гидроксистеарат, ароматизатор колы, декстрозы (глюкозы) моногидрат, декстроза (глюкоза) жидкая, вода очищенная.

100 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с мерным колпачком - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противодиарейное средство растительного происхождения. Механизм антиперистальтического действия Узары основывается на стимуляции симпатической нервной системы, в результате чего происходит ослабление моторики кишечника.

Помимо угнетения моторики пищеварительного тракта, Узара оказывает спазмолитический, антисекреторный, вяжущий и обволакивающий эффект.

Показания к применению:

Неспецифическая острая и хроническая диарея:

- диарея, связанная с аллергическими реакциями;
- диарея, вызванная психоэмоциональными факторами;
- диарея, вызванная нарушениями метаболизма и всасывания питательных веществ;
- "диарея путешественников", обусловленная изменением режима питания и привычного рациона.

В качестве вспомогательного средства при диарее инфекционного генеза.

Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Диарея](#)
- [Инфекции](#)

Противопоказания:

- лечение сердечными гликозидами;
- беременность;
- период лактации;
- детский возраст до 1 года;
- гиперчувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Внутрь, независимо от приема пищи.

Взрослые: начальная доза в первый день - 25 мл сиропа однократно, в последующие дни - по 5 мл 3-6 раз/сут до нормализации стула.

Дети школьного возраста (от 7 до 16 лет): начальная доза в первый день 5-7 мл сиропа, в последующие дни по 3-4 мл 3-6 раз/сут.

Дети дошкольного возраста (от 2 до 6 лет): по 1-2 мл сиропа 3-6 раз/сут.

Дети от 1 до 2 лет: по 0.5 мл сиропа 3 раза/сут.

Побочное действие:

Аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

В экспериментальных исследованиях тератогенных, мутагенных свойств Узары выявлено не было. До настоящего времени не сообщалось о каких-либо пороках развития при применении препарата.

Поскольку клинический опыт применения препарата у беременных и кормящих женщин очень ограничен, применение Узары в период беременности и лактации не показано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении с препаратами кальция, салуретиками или при длительной терапии препаратами кортизола возможно возникновение нарушений сердечного ритма.

Особые указания и меры предосторожности:

Если длительность диареи превышает 2 дня, сопровождается высокой температурой тела, а также, если в стуле имеются примеси крови, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Использование в педиатрии

У детей препарат должен применяться под контролем врача во избежание передозировки.

У детей до 6 лет обязательно в качестве основной терапии использовать препараты оральной регидратации. Курс лечения не должен превышать 7 дней.

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Uzara>