

## Вагиферон



### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Интерферон альфа-2b](#)
- [Метронидазол](#)
- [Флуконазол](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Суппозитории вагинальные** белого или белого с желтоватым оттенком цвета, торпедообразной формы.

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
|                                                 | <b>1 супп.</b>    |
| интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный | не менее 50000 ME |
| метронидазол                                    | 150 мг            |
| флуконазол                                      | 200 мг            |

*Вспомогательные вещества:* борная кислота 400 мг, динатрия эдетат 2 мг, основа (макрогол 1500 92%, макрогол 400 8%) до 2 г.

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Иммуностимулирующие средства](#)
- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)
- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Комбинированный препарат для интравагинального применения.

Вагиферон обладает противовирусным, иммуномодулирующим, противовоспалительным, противогрибковым, противомикробным и противопротозойным (трихомонацидным) действием.

*Интерферон альфа-2b* обладает выраженными противовирусными, иммуномодулирующими свойствами.

*Метронидазол* - противопротозойный и антибактериальный препарат, производное 5-нитроимидазола. Механизм действия заключается в биохимическом восстановлении 5-нитрогруппы метронидазола внутриклеточными транспортными белками анаэробных микроорганизмов и простейших. Восстановленная 5-нитрогруппа

метронидазола взаимодействует с ДНК клетки микроорганизмов, ингибируя синтез их нуклеиновых кислот, что ведет к гибели бактерий. Активен в отношении *Trichomonas vaginalis*, *Gardnerella vaginalis*, а так же грамотрицательных анаэробов *Bacteroides* spp. (в т.ч. *B. fragilis*, *B. distasonis*, *B. status*, *B. thetaiotaomicron*, *B. vulgaris*), *Fusobacterium* spp. и некоторых грамположительных анаэробов (чувствительные штаммы *Eubacterium* spp., *Clostridium* spp., *Peptococcus niger*, *Peptostreptococcus* spp., *Mobiluncus* spp.). К метронидазолу нечувствительны аэробные микроорганизмы и факультативные анаэробы.

Флуконазол обладает высокоспецифичным фунгицидным (противогрибковым) действием. Активен при микозах, в т.ч. вызванных *Candida* spp. (включая генерализованные формы кандидоза на фоне иммунодепрессии), *Cryptococcus neoformans* и *Coccidioides immitis*, *Microsporium* spp., *Blastomyces dermatitidis*. При интравагинальном применении особенно активен в отношении *Candida albicans*, в меньшей степени - в отношении *Candida glabrata*.

#### **Фармакокинетика**

После интравагинального введения биодоступность метронидазола составляет 20% по сравнению с пероральным приемом. После интравагинального введения подвергается системной абсорбции (около 56%). Метаболизируется в печени путем гидроксилирования, окисления и глюкуронирования. Активность основного метаболита (2-оксиметронидазол) составляет 30% активности исходного соединения.  $T_{1/2}$  составляет 6-12 ч. Выводится на 40-70% (около 20% в неизменной форме) через почки. Фармакокинетика интерферона и флуконазола при интравагинальном способе применения не изучалась.

### **Показания к применению:**

- бактериальный вагиноз;
- бактериальные (неспецифические) вагиниты;
- вагиниты, вызванные смешанной инфекцией (трихомонады, гарднереллы, дрожжеподобные грибы, вирус простого герпеса 1 и 2 типа, микопlasма, уреаплазма) в составе комплексной терапии.

### **Относится к болезням:**

- [Вагинит](#)
- [Герпес](#)
- [Инфекции](#)
- [Микоплазмоз](#)
- [Уреаплазма](#)

### **Противопоказания:**

- беременность;
- детский возраст до 18 лет (эффективность и безопасность применения препарата не установлена);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата (в т.ч. к производным нитроимидазола).

### **Способ применения и дозы:**

Интравагинально.

По 1 суппозитории вечером (перед сном), в течение 10 дней.

### **Побочное действие:**

При *местном применении* побочные эффекты не выявлены. В отдельных случаях возможны аллергические реакции и местные реакции.

Побочные действия, характерные для метронидазола, поскольку его системная абсорбция 56%: аллергические реакции (редко), лейкопения, атаксия, изменения психики (тревожность, лабильность настроения), судороги, редко: диарея, запор, головокружение, головная боль, потеря аппетита, тошнота, рвота, боли и спазмы в животе, изменение вкуса (редко), сухость во рту, "металлический" или неприятный привкус, повышенная утомляемость.

## Передозировка:

Случаи передозировки препарата не выявлены. При передозировке метронидазола возможны тошнота, рвота, боль в животе, диарея, зуд, "металлический" привкус во рту, атаксия, головокружение, парестезии, судороги, лейкопения, темное окрашивание мочи.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат не применяется при беременности.

Метронидазол проникает в грудное молоко. Грудное вскармливание в период приема препарата должно быть отменено. Возобновлять грудное вскармливание следует не ранее, чем через 48 ч после окончания применения препарата.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не рекомендуется сочетать с недеполяризующими миорелаксантами (векурония бромид).

Возможно совместное применение с антибиотиком-макролидом (джозамицином) системного действия.

## Особые указания и меры предосторожности:

В период лечения препаратом рекомендуется воздерживаться от половых контактов.

В случае применения препарата совместно с метронидазолом для приема внутрь, особенно при повторном курсе, необходим контроль картины периферической крови (опасность лейкопении).

В период лечения противопоказан прием этанола (возможно развитие дисульфирамоподобных реакций: абдоминальная боль спастического характера, тошнота, рвота, головная боль, внезапный "прилив" крови к лицу). Не следует назначать метронидазол больным, которые принимали дисульфирам в течение последних 2 недель.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказан:

— детский возраст до 18 лет (эффективность и безопасность применения препарата не установлена).

## Условия хранения:

При температуре от 2°C до 8°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Не использовать после истечения срока годности.

## Срок годности:

2 года.

## Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Vagiferon?page=1>