

Вагинорм-С



Код АТХ:

- [G01AD03](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Аскорбиновая кислота](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Таблетки вагинальные** от белого до белого со светло-желтым оттенком цвета, овальные.

	1 таб.
аскорбиновая кислота	250 мг

Вспомогательные вещества: полиметилсилоксан - 10 мг, лактозы моногидрат - 670 мг, гипромеллоза - 60 мг, магния стеарат - 10 мг.

6 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Аскорбиновая кислота снижает pH влагалища, ингибирует рост бактерий и способствует восстановлению и поддержанию нормальных показателей pH и флоры влагалища (*Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus gasseri*).

Таким образом, при снижении pH влагалища в течение нескольких дней происходит выраженное подавление роста анаэробных бактерий, а также восстановление нормальной флоры (*Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus gasseri*).

Фармакокинетика

В системном кровотоке обнаруживается в незначительном количестве. Выводится почками.

Показания к применению:

Вагинорм-С

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

— хронический или рецидивирующий вагинит (бактериальный вагиноз, неспецифический вагинит), обусловленный анаэробной флорой (вследствие измененного pH влагалища);

— для нормализации нарушенной микрофлоры влагалища.

Относится к болезням:

- [Вагинит](#)

Противопоказания:

- кандидозный вульвовагинит;
- гиперчувствительность к любому из компонентов препарата.

Способ применения и дозы:

Применяют интравагинально. 1 вагинальную таблетку вводят во влагалище лежа на спине при слегка согнутых ногах 1 раз/сут вечером перед сном.

Курс лечения составляет 6 дней. Возможны повторные курсы лечения. При необходимости курс лечения можно продлить на более длительный срок.

Побочное действие:

Аллергические реакции: очень редко (< 1/10 000) - гиперчувствительность к одному из компонентов препарата.

Местные реакции: редко (< 1/100, ≥ 1/1000) - жжение или зуд во влагалище, усиление слизистых выделений, гиперемия, отечность вульвы.

Препарат хорошо переносится.

Передозировка:

Случаи передозировки не описаны.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата при беременности и в период лактации не противопоказано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Салицилаты стимулируют процесс выведения аскорбиновой кислоты из организма.

Эстрогены повышают биодоступность аскорбиновой кислоты.

Аскорбиновая кислота снижает активность антикоагулянтов.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат не угнетает рост грибковой флоры влагалища.

Перерывы в применении препарата Вагинорм-С в связи с межциклическими или менструальными кровотечениями не обязательны.

Аскорбиновая кислота влияет на результаты определения содержания глюкозы в моче, содержания трансаминаз, лактатдегидрогеназы и билирубина в сыворотке крови.

Вагинорм-С

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Такие проявления, как жжение и зуд могут быть обусловлены наличием сопутствующей асимптоматической грибковой инфекции. Поэтому при данных симптомах следует провести анализ для исключения грибковой инфекции.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Vaginorm-S>