Ваготил



Код АТХ:

- D08AE02

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Поликрезулен

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Раствор для местного применения от красно-оранжевого до буро-красного цвета, прозрачный, почти без запаха.

	1 г
поликрезулен	360 мг

Вспомогательные вещества: вода деминерализованная.

50 г - флаконы коричневого стекла (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антибактериальный препарат.

Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в т.ч. Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Salmonella spp.

Препарат *активен также в отношении* Trichomonas vaginalis и Candida albicans.

Обладает местным сосудосуживающим и гемостатическим действием.

При местном применении быстро покрывает измененную ткань белым опалесцирующим слоем, сохраняющимся 2-7 дней. Таким образом, некротизированные ткани отделяются от здоровых, создавая тем самым благоприятные условия для регенерации.

Применение Ваготила не приводит к возникновению рубцов.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Ваготил не предоставлены.

Показания к применению:

— эрозия влагалища и шейки матки (в т.ч. вызванная давлением пессариев);

— вагиниты, вызванные Trichomonas vaginalis и Candida albicans;

— кровотечение после проведения диагностической биопсии и удаления полипов, электрокоагуляции эрозии шейки матки;

— местное лечение трудно заживающих ран, в т.ч. трофических язв голени;

— с целью гемостаза при небольших хирургических и стоматологических вмешательствах.

Относится к болезням:

- Вагинит
- Стоматит

Противопоказания:

— беременность;

— лактация;

— применение во время менструации при лечении гинекологических заболеваний;

— при лечении гинекологических заболеваний следует отказаться от половой жизни и не использовать мыльные растворы при гигиенических процедурах;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует применять при кариесе во время проведения стоматологических операций.

Способ применения и дозы:

Препарат предназначен только для местного применения.

При *эрозии влагалища и шейки матки* на 1-3 мин накладывают пропитанный препаратом тампон, избыток препарата следует удалить сухим тампоном. Процедуру следует повторять 2-3 раза в неделю, но не более 10 дней.

При *язвах, трещинах слизистой оболочки, ожогах, а также для спринцевания влагалища* применяют раствор, полученный при разведении 10-15 мл препарата в 1 л теплой воды.

С *целью гемостаза* накладывают на кровоточащее место пропитанный препаратом тампон на 1-3 мин.

Побочное действие:

Аллергические реакции: зуд, сыпь, жжение, местное раздражение, анафилаксия.

При проведении гинекологических процедур: покраснение, отек влагалища и вульвы, чувство инородного тела во влагалище.

При аппликации на слизистую оболочку полости рта: повреждение эмали зубов.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Ваготил не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано применение при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

С препаратами, имеющими щелочную реакцию, происходит экзотермическая реакция, усиливающая химический ожог слизистых оболочек.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат следует применять строго по назначению врача.

При лечении препаратом не назначают другие лекарственные средства для местного применения.

При применении в стоматологии необходимо избегать попадания препарата на зубную эмаль, в случае контакта с зубами следует тщательно прополоскать рот теплой водой.

Во влагалищных мазках ВИЧ-инфицированных женщин, получающих поликрезулен, обнаружено повышенное количество копий РНК ВИЧ-1, что может облегчать инфицирование партнера.

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С.

С препаратом следует обращаться с осторожностью, т.к. он является сильной кислотой.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Vagotil