

[Ваготил](#)



Код АТХ:

- [D08AE02](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Поликрезулен](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Раствор для местного применения от красно-оранжевого до буро-красного цвета, прозрачный, почти без запаха.

	1 г
поликрезулен	360 мг

Вспомогательные вещества: вода деминерализованная.

50 г - флаконы коричневого стекла (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антибактериальный препарат.

Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в т.ч. *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus vulgaris*, *Salmonella spp.*

Препарат *активен также в отношении* *Trichomonas vaginalis* и *Candida albicans*.

Обладает местным сосудосуживающим и гемостатическим действием.

При местном применении быстро покрывает измененную ткань белым опалесцирующим слоем, сохраняющимся 2-7 дней. Таким образом, некротизированные ткани отделяются от здоровых, создавая тем самым благоприятные условия для регенерации.

Применение Ваготила не приводит к возникновению рубцов.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Ваготил не предоставлены.

Показания к применению:

- эрозия влагалища и шейки матки (в т.ч. вызванная давлением пессариев);
- вагиниты, вызванные *Trichomonas vaginalis* и *Candida albicans*;
- кровотечение после проведения диагностической биопсии и удаления полипов, электрокоагуляции эрозии шейки матки;
- местное лечение трудно заживающих ран, в т.ч. трофических язв голени;
- с целью гемостаза при небольших хирургических и стоматологических вмешательствах.

Относится к болезням:

- [Вагинит](#)
- [Стоматит](#)

Противопоказания:

- беременность;
- лактация;
- применение во время менструации при лечении гинекологических заболеваний;
- при лечении гинекологических заболеваний следует отказаться от половой жизни и не использовать мыльные растворы при гигиенических процедурах;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует применять при кариесе во время проведения стоматологических операций.

Способ применения и дозы:

Препарат предназначен только для местного применения.

При *эрозии влагалища и шейки матки* на 1-3 мин накладывают пропитанный препаратом тампон, избыток препарата следует удалить сухим тампоном. Процедуру следует повторять 2-3 раза в неделю, но не более 10 дней.

При *язвах, трещинах слизистой оболочки, ожогах, а также для спринцевания влагалища* применяют раствор, полученный при разведении 10-15 мл препарата в 1 л теплой воды.

С *целью гемостаза* накладывают на кровоточащее место пропитанный препаратом тампон на 1-3 мин.

Побочное действие:

Аллергические реакции: зуд, сыпь, жжение, местное раздражение, анафилаксия.

При проведении гинекологических процедур: покраснение, отек влагалища и вульвы, чувство инородного тела во влагалище.

При аппликации на слизистую оболочку полости рта: повреждение эмали зубов.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Ваготил не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано применение при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

С препаратами, имеющими щелочную реакцию, происходит экзотермическая реакция, усиливающая химический ожог слизистых оболочек.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат следует применять строго по назначению врача.

При лечении препаратом не назначают другие лекарственные средства для местного применения.

При применении в стоматологии необходимо избегать попадания препарата на зубную эмаль, в случае контакта с зубами следует тщательно прополоскать рот теплой водой.

Во влажных мазках ВИЧ-инфицированных женщин, получающих поликрезулен, обнаружено повышенное количество копий РНК ВИЧ-1, что может облегчать инфицирование партнера.

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

С препаратом следует обращаться с осторожностью, т.к. он является сильной кислотой.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Vagotil>