# Вакцина Гриппозная Инактивированная Элюатно-Центрифужная (Вакцина Гриппозная)



## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

| ***Суспензия для п/к введения*** | **1 доза** |
|---|---|
| гемагглютинин вирусных штаммов | |
| грипп серотипа А ($H_1N_1$) | 10±1 мкг |
| грипп серотипа А ($H_3N_2$) | 10±1 мкг |
| грипп серотипа В | 13±1 мкг |

*Вспомогательные вещества:* альбумин р-р д/инф. 10% и 20%, тиомерсал 50±7.5 мкг.

0.5 мл - ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
0.5 мл - ампулы (10) - коробки картонные.
0.5 мл - шприцы (1) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Вакцина вызывает формирование специфического иммунитета против вируса гриппа типов А и В. Защитный эффект вакцины, как правило, наступает через 3 недели после вакцинации и сохраняется 10-12 месяцев.

## Показания к применению:

— профилактика гриппа у взрослых старше 18 лет.

## Относится к болезням:

- Грипп

## Противопоказания:

— аллергические реакции на куриные яйца и гиперчувствителыюсть к куриному белку;

— реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение сезонных противогриппозных вакцин;

— острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения - прививки проводят не ранее чем через месяц после выздоровления (ремиссии). При нетяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях вакцинацию проводят после нормализации температуры;

— системные диффузные заболевания соединительной ткани;

— заболевания надпочечников;

— наследственные, дегенеративные и прогредиентные заболевания нервной системы;

— беременность и лактация.

Возможность вакцинации лиц, страдающих хроническими заболеваниями, не указанными в перечне противопоказаний, определяет лечащий врач, исходя из состояния больного.

## Способ применения и дозы:

Прививки проводят в осенне-зимний период.

Ежегодная вакцинация рекомендована в первую очередь лицам с высоким риском возникновения осложнений и лицам, по роду профессий имеющим высокий риск заболевания гриппом или заражения других лиц:

— лица старше 60 лет;

— лица страдающие хроническими соматическими заболеваниями;

— часто болеющие ОРЗ;

— медицинские работники;

— работники сферы обслуживания, транспорта, учебных заведений.

Вакцину вводят однократно, подкожно, в дозе 0,5 мл, в область наружной поверхности плеча на несколько сантиметров ниже плечевого сустава.

Перед применением ампулу с препаратом необходимо тщательно встряхивать.

Не пригоден к применению препарат в ампулах с нарушенной целостностью или маркировкой, при изменении физических свойств (цвета, прозрачности, гомогенности), при истекшем сроке годности, неправильном хранении.

Вскрытие ампул и процедуру вакцинации осуществляют при строгом соблюдении правил асептики и антисептики.

Препарат во вскрытой ампуле хранению не подлежит.

Проведенную прививку регистрируют в установленных учетных формах с указанием даты введения препарата, дозы, номера серии и наименования предприятия-производителя.

## Побочное действие:

При введении препарата у части привитых могут наблюдаться общие реакции в виде недомогания, головной боли, повышения температуры тела. Допускается не более 3 % реакций свыше 37,5°С (в том числе не более 0,5 % свыше 38,5°С), зарегистрированных в первые двое суток после иммунизации, длительностью не более трех суток.

Местные реакции (гиперемия и отечность) возникают у большинства привитых; у части привитых могут образовываться ограниченные инфильтраты. Развитие инфильтрата размером до 50 мм допускается не более чем в 3 %. Продолжительность местных реакций не превышает 5 суток.

## Передозировка:

Случаи передозировки не установлены.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности, в период лактации.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Вакцина гриппозная может применяться одновременно с другими вакцинами Национального календаря профилактических прививок и инактивированными вакцинами календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, вводимых взрослым. При этом должны учитываться противопоказания к каждой из применяемых вакцин, препараты должны вводиться в разные участки тела разными шприцами.

## Особые указания и меры предосторожности:

*Меры предосторожности при применении*

Все лица, подлежащие прививкам, должны быть обследованы врачом с учетом анамнестических данных. В день прививки
вакцинируемые должны быть осмотрены врачом с обязательной термометрией. При температуре выше 37°С вакцинацию не проводят. За правильность назначения прививки отвечает врач.

После вакцинации привитой должен находиться под медицинским наблюдением не менее 30 мин. Место проведения прививок должно быть обеспечено средствами противошоковой терапии.

*Сведения о возможном влиянии лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами.*

Не установлены.

***Применение в пожилом возрасте***

Ежегодная вакцинация рекомендована в первую очередь лицам с высоким риском возникновения осложнений и лицам, по роду профессий имеющим высокий риск заболевания гриппом или заражения других лиц, например, лица старше 60 лет.

***Применение в детском возрасте***

Применяют у взрослых старше 18 лет

## Условия хранения:

Хранят в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 8°С в недоступном для детей месте. Замораживание не допускается. Срок годности - 1 год.

## Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Vakcina_Grippoznaya_Inaktivirovannaya_Elyuatno-Centrifuzhnaya_Vakcina_Grippoznaya