

[Вакцина Менингококковая Группы А Полисахаридная Сухая](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Вызывает нарастание специфических антител к *Neisseria meningitidis* серогрупп А, С, W₁₃₅ и Y.

Показания к применению:

Профилактика менингококковой инфекции, вызванной менингококками групп А и С у детей и взрослых.

Относится к болезням:

- [Инфекции](#)
- [Менингит](#)
- [Менингококковая инфекция](#)

Противопоказания:

Острые и хронические заболевания.

Способ применения и дозы:

Однократная вакцинация начиная с 18-месячного возраста в 1 дозе независимо от возраста. Вакцину вводят п/к или в/м.

Побочное действие:

Очень редко: (более вероятно у взрослых) в первые 72 ч после введения - незначительная лихорадка, озноб, слабость; незначительное и непродолжительное покраснение кожи и болезненность в месте введения вакцины.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Беременность и лактация не являются противопоказанием в неблагоприятных эпидемических ситуациях.

Особые указания и меры предосторожности:

Не подлежат вакцинации дети в возрасте до 18 месяцев, исключая эпидемические ситуации, т.к. на компонент А вакцины иммунитет может развиваться уже с 3 месяцев, а на компонент С - практически не развивается.

Применение в детском возрасте

Не подлежат вакцинации дети в возрасте до 18 месяцев, исключая эпидемические ситуации, т.к. на компонент А вакцины иммунитет может развиваться уже с 3 месяцев, а на компонент С - практически не развивается.

Источник: http://drugs.thead.ru/Vakcina_Meningokokkovaya_Gruppy_A_Polisaharidnaya_Suhaya