

Валдисперт



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Таблетки, покрытые оболочкой	1 таб.
экстракт корневищ с корнями валерианы лекарственной	200 мг
25 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.	
25 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.	
25 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.	

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Оказывает седативное, спазмолитическое действие. Облегчает наступление естественного сна.

Показания к применению:

- повышенная нервная возбудимость;
- нарушения сна (затруднения при засыпании);
- раздражительность.

Противопоказания:

- дефицит сахаразы/изомальтазы, дефицит лактазы, непереносимость фруктозы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- детский возраст до 12 лет.

С осторожностью: заболевания печени, сахарный диабет.

Способ применения и дозы:

Внутрь, не разжевывая, запивая водой.

Взрослые и дети старше 12 лет:

- для снижения нервного напряжения по 1-3 таблетки 1-3 раза в день;

- при нарушении засыпания разовая доза препарата 1-3 таблетки за 30 минут до сна, при необходимости возможен более ранний прием в течение вечера одной разовой дозы препарата (1-3 таблетки).

Для пожилых людей коррекция дозы не требуется.

Курс лечения 1,5-2 месяца.

Побочное действие:

При соблюдении рекомендаций по применению препарата - Валдисперт возникновения каких-либо нежелательных побочных реакций, связанных с его применением, не наблюдалось.

При приеме препарата возможны аллергические реакции; при длительном применении - запор.

Передозировка:

При приеме дозы, превышающей рекомендуемую суточную дозу, возможно появление следующих симптомов: сонливость, снижение работоспособности, абдоминальные боли, тяжесть в груди, головокружение, тремор, мидриаз.
Лечение: промывание желудка, симптоматическое.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Ввиду отсутствия данных о воздействии препарата при беременности и в период грудного вскармливания его применение не рекомендуется.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Усиливает действие снотворных, седативных средств, транквилизаторов, этанола и других лекарственных средств, угнетающих центральную нервную систему, а также спазмолитиков, что требует коррекции дозы при совместном применении.

Особые указания и меры предосторожности:

Не следует принимать препарат более 1,5-2 месяцев ежедневно.

Информация для больных сахарным диабетом: одна таблетка содержит 122,11 мг сахарозы и 21,85 мг лактозы, что составляет 0,012 хлебных единиц (ХЕ).

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

При нарушениях функции печени

С осторожностью при заболеваниях печени.

Применение в пожилом возрасте

Для пожилых людей коррекция дозы не требуется.

Применение в детском возрасте

Противопоказано детям до 12 лет.

Условия хранения:

При температуре не выше 30°C. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Valdispert>