Валемидин



Код АТХ:

N05CM

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр Википедия РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com^{англ}

Форма выпуска:

 \Diamond **Капли для приема внутрь спиртовые** в виде прозрачной жидкости желто-бурого или зеленоватого цвета, с характерным запахом; при хранении допускается помутнение с последующим выпадением естественного осадка.

	50 мл
настойка валерианы	16.6 мл
настойка пустырника	16.6 мл
настойка боярышника	8.4 мл
настойка мяты перечной	8.4 мл
дифенгидрамин	50 мг

⁵⁰ мл - флакон-капельницы (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

• Нейротропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат. Оказывает седативное и спазмолитическое действие.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата не предоставлены.

Показания к применению:

- неврозы;
- нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу.

Относится к болезням:

- Гипертония
- Неврит
- Неврозы
- Нейроциркуляторная дистония

Противопоказания:

- выраженные нарушения функции печени;
- выраженные нарушения функции почек;
- артериальная гипотензия;
- брадикардия (менее 55 уд./мин);
- острая сердечная недостаточность;
- хроническая сердечная недостаточность;
- беременность;
- период лактации (грудного вскармливания);
- детский возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают взрослым по 30-40 капель 3-4 раза/сут.

Принимают внутрь, предварительно разведя в небольшом количестве воды, за 30 мин до еды.

Курс лечения - 10-15 дней. При необходимости возможно повторение курса лечения, но не ранее чем через 1-1.5 мес.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: редко - диспепсия; при длительном применении - сухость во рту.

Прочие: аллергические реакции.

Передозировка:

Данных о передозировке препарата Валемидин в настоящее время нет.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано применение препарата при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном назначении с лекарственными средствами, угнетающими ЦНС (седативные, снотворные, транквилизаторы, нейролептики) возможно взаимное усиление эффектов.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат содержит дифенгидрамин и этанол, поэтому в период его применения необходимо воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

При нарушениях функции почек

Противопоказано: выраженные нарушения почек.

При нарушениях функции печени

Противопоказано: выраженные нарушения функции печени.

Применение в детском возрасте

Противопоказано: детский возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

Условия хранения:

Препарат следует хранить при температуре не выше 25°C, в недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Valemidin