

Валерианахель



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◊ **Капли для приема внутрь гомеопатические** темно-красно-коричневого цвета, прозрачные, с запахом валерианы (иногда при хранении могут наблюдаться едва заметные хлопья).

	100 г
Valeriana officinalis (валериана официналис) ?	65 г
Humulus lupulus (хумулюс люпулюс) ?	5 г
Crataegus (кратегус) ?	5 г
Hypericum perforatum (гиперикум перфоратум) D1	5 г
Melissa officinalis (мелисса официналис) ?	3 г
Chamomilla recutita (камомилла рекутита) ?	2 г
Avena sativa (авена сатива) ?	2 г
Acidum picrinicum (ацидум пикриникум) D5	10 г
Kalium bromatum (калиум броматум) D1	1 г
Ammonium bromatum (аммониум броматум) D1	1 г
Natrium bromatum (натриум броматум) D1	1 г

Вспомогательные вещества: этанол (около 60 об.%).

30 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) - пачки картонные.

◊ **Капли для приема внутрь гомеопатические** темно-красно-коричневого цвета, прозрачные, с запахом валерианы (иногда при хранении могут наблюдаться едва заметные хлопья).

	100 г
Valeriana officinalis (валериана официналис) ?	65 г
Humulus lupulus (хумулюс люпулюс) ?	5 г
Crataegus (кратегус) ?	5 г
Hypericum perforatum (гиперикум перфоратум) D1	5 г
Melissa officinalis (мелисса официналис) ?	3 г
Chamomilla recutita (камомилла рекутита) ?	2 г
Avena sativa (авена сатива) ?	2 г
Acidum picrinicum (ацидум пикриникум) D5	10 г
Kalium bromatum (калиум броматум) D1	1 г
Ammonium bromatum (аммониум броматум) D1	1 г
Natrium bromatum (натриум броматум) D1	1 г

Вспомогательные вещества: этанол (около 60 об.%).

30 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гомеопатическое средство.

Показания к применению:

— в качестве седативного средства при неврозах, неврастении, нарушениях сна, состояниях повышенной нервной возбудимости.

Относится к болезням:

- [Астения](#)
- [Неврит](#)
- [Неврозы](#)

Противопоказания:

- детский возраст до 2 лет (в связи с недостаточностью клинических данных);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают внутрь; **взрослым и подросткам** по 15 капель, предварительно разведенных в 100 мл воды, 3 раза в день (вечером можно применять по 20 капель), за 30 минут до еды или через 1 час после приема пищи; **детям от 6 до 12 лет** - 10 капель 3 раза в день, **детям от 2 до 6 лет** - по 5 капель 3 раза в день.

Курс лечения — 3-4 недели. Проведение повторного курса лечения возможно по назначению врача.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Использование препарата не исключает применение аллопатических лекарственных средств.

Особые указания и меры предосторожности:

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.

Препарат содержит этиловый спирт около 60% (объемных).

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

При применении в рекомендуемых дозах Валерианахель не оказывает влияния на безопасность при управлении транспортом и работе с механизмами.

Применение в детском возрасте

В связи с недостаточностью клинических данных не назначают детям в возрасте до 2 лет.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от 15°C до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте! Срок годности - 3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Valerianahel>