## Валерианы корневища с корнями



## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

• Валерианы лекарственной корневища с корнями

#### Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр $^{\mathrm{MHH}}$  Википедия $^{\mathrm{MHH}}$  РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com $^{\mathrm{ahr}}$ 

## Форма выпуска:

◊ Сырье растительное - порошок	1 фильтр-пакет
корневища с корнями валерианы лекарственной	1.5 г
1 (20)	

фильтр-пакеты (20) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Настой корневищ с корнями валерианы проявляет умеренно выраженный седативный эффект. Седативный эффект наступает медленно, но достаточно стабилен. Кроме того, препарат обладает спазмолитическими свойствами.

#### Показания к применению:

Повышенная нервная возбудимость, бессонница; в составе комплексной терапии — функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы, спазмы органов желудочно-кишечного тракта.

#### Относится к болезням:

- Бессонница
- Спазмы

### Противопоказания:

Повышенная чувствительность к препаратам валерианы, детский возраст (до 1 года).

## Способ применения и дозы:

# Фармакологическая база данных (http://drugs.thead.ru)

3 фильтр-пакета помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипятка, накрывают крышкой и настаивают в течение 15 мин. Содержимое фильтр-пакетов отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 100 мл. Настой назначают внутрь, через 30 мин после еды:

взрослым no1 столовой ложке 3-4 раза в день;

детям старше 12 лет - по 1 столовой ложке 2-3 раза в день;

детям от 7 до 12 лет - по 1 десертной ложке 2-3 раза в день;

детям от 3 до 6 лет - по 1 чайной ложке 2-3 раза в день;

детям от 1 года до 3-х лет - по 1/2 чайной ложке 2 раза в день.

Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

## Побочное действие:

Сонливость, слабость, снижение работоспособности, при длительном применении - запор. В отдельных случаях возможно развитие аллергических реакций.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности и в период лактации возможно. Необходимо проконсультироваться с врачом.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Усиливает действие снотворных и седативных лекарственных средств, а также спазмолитиков.

## Особые указания и меры предосторожности:

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

#### Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 1 года.

### Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте. Готовый настой - в прохладном месте не более 2-х сут. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности - 3 года. Не применять по истечении срока годности.

## Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Valeriany kornevishcha s kornyami