

## [Валерианы настойка \(настойка\)](#)



### Код АТХ:

- [N05CM09](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Валерианы лекарственной корневища с корнями](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

↙ <b>Настойка</b>	<b>1 л</b>
корневища с корнями валерианы лекарственной	200 г

*Вспомогательные вещества:* этанол.

25 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

40 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

50 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Настойка валерианы проявляет умеренно выраженный седативный эффект. Действующим началом препарата являются сложный эфир борнеола и изовалериановой кислоты, свободная валериановая кислота. Седативный эффект наступает медленно, но достаточно стабильно. Кроме того, препарат оказывает спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру желудочно-кишечного тракта.

### Показания к применению:

— повышенная нервная возбудимость;

— бессонница;

## Валерианы настойка (настойка)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

- функциональные расстройства сердечнососудистой системы;
- спазмы желудочно-кишечного тракта.

### Относится к болезням:

- [Спазмы](#)

### Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- беременность;
- период лактации.

*С осторожностью:* хронический энтероколит.

### Способ применения и дозы:

Принимают внутрь, до еды, разводя в небольшом количестве воды. Взрослым по 20 - 30 капель на прием 3-4 раза в день, детям - столько капель на прием, сколько ребенку лет.

### Побочное действие:

Возможны вялость, слабость (особенно при применении в высоких дозах), при длительном применении - запоры. В отдельных случаях возможно развитие аллергических реакций.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Запрещено принимать препарат во время беременности и в период лактации.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препарат усиливает действие снотворных средств и других лекарственных препаратов, угнетающих центральную нервную систему.

### Особые указания и меры предосторожности:

При длительном применении в больших дозах возможно снижение психомоторных реакций, что следует учитывать при вождении транспорта, работе с механизмами и т.п.

### Условия хранения:

Препарат следует хранить в защищенном от света месте при температуре от 10 до 20°C в недоступном для детей месте.

**Срок годности** - 2 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

### Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

## **Валерианы настойка (настойка)**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Valeriany\\_nastoyka\\_nastoyka](http://drugs.thead.ru/Valeriany_nastoyka_nastoyka)