Валидол



Код АТХ:

- C01EX

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Левоментола раствор в ментил изовалерате

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Таблетки, в контурной ячейковой упаковке 6 или 10 шт.

Капли для приема внутрь, во флаконах-капельницах оранжевого стекла по 5 мл, в картонной пачке 1 флакон.

Состав:

Одна таблетка содержит

Активное вещество: раствор ментола в ментиловом эфире изовалериановой кислоты 60 мг.

Описание:

Таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской и риской, белого или желтовато-белого цвета, с характерным запахом ментола. На поверхности таблеток допускаются серые вкрапления и налет порошка сахарной пудры.

Фармакотерапевтическая группа:

- Нейротропные средства
- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Валидол оказывает умеренное рефлекторное сосудорасширяющее действие, обладает седативным эффектом.

Действие препарата в значительной степени обусловлено рефлекторными реакциями, связанными с раздражением чувствительных нервных окончаний. Раздражение рецепторов слизистых оболочек сопровождается стимуляцией образования и высвобождения энкефалинов, эндорфинов, динорфинов и пептидов, играющих важную роль в регуляции болевых ощущений, проницаемости сосудов и других процессов. Под влиянием раздражающих веществ высвобождается ряд других эндогенных физиологически активных соединений (гистамин, кинины и другое).

Фармакокинетика

При сублингвальном приеме валидола терапевтический эффект наступает в среднем через 5 минут и продолжается 3-10 часов. Метаболизируется в печени путем конъюгации с глюкуроновой кислотой, выводится почками в виде глюкуронидов.

Показания к применению:

Валидол применяется при:

— стенокардия ангионевротического характера (в составе комбинированной терапии);

— нейро-циркуляторная дистония по кардиальному типу, функциональные кардиалгии;

— головная боль на фоне приема нитратов;

— неврозы;

— истерия, истерические состояния;

— как противорвотное при морской и воздушной болезнях (синдром "укачивания").

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, выраженная артериальная гипотензия, детский возраст до 2 лет.

Способ применения и дозы:

Валидол назначают под язык. Таблетку следует держать во рту под языком до полного растворения. Принимают по 1 таблетке 2-3 раза в день.

Суточная кратность и продолжительность приема валидола определяется в зависимости от эффективности лечения. Валидол применяется симптоматически и при купировании симптомов прием препарата прекращается. При терапии хронических состояний - неврозы, функциональные кардиалгии - курс приема препарата составляет 5-7 дней и может быть продлен до нескольких недель. При стеокардии Валидол может применятся как угодно долго. При недостаточно выраженном эффекте или когда у отдельных больных в ближайшие 5 минут после приема препарата эффект не наблюдается, необходимо назначение другой терапии.

Побочное действие:

Редко — незначительная тошнота, слезотечение, головокружение, головная боль.

Передозировка:

Передозировка маловероятна, в связи с низкой токсичностью компонентов препарата, но при преднамеренном приеме препарата в большом количестве возможное развитие гиперчувствительности.

Лечение: промывание желудка, прием десенсибилизирующих средств.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение Валидола в периоды беременности и лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Валидол облегчает головную боль, вызванную применением нитратов, усиливает действие седативных средств.

Особые указания и меры предосторожности:

Валидол является эффективным средством при головной боли, вызванной приемом нитратов. Следует назначать с осторожностью больным сахарным диабетом. Валидол можно использовать в качестве первой помощи при укусах пчёл и ос. Надо смочить таблетку валидола и натереть место укуса.

Условия хранения:

В сухом месте, при температуре не выше 15 °C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Validol