

## Валидол-Рос



### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Оказывает седативное действие, обладает умеренным рефлекторным сосудорасширяющим действием, обусловленным раздражением чувствительных нервных окончаний. Стимулирует выработку и освобождение энкефалинов, эндорфинов и ряда других пептидов, гистамина, кининов (за счет раздражения рецепторов слизистой оболочки), которые принимают активное участие в регуляции проницаемости сосудов, формировании болевых ощущений. При сублингвальном приеме терапевтический эффект в среднем наступает через 5 мин, при этом до 70% препарата высвобождается в течение 3 мин.

### **Показания к применению:**

- кардиалгия;
- стенокардия;
- синдром "укачивания" (тошнота, рвота при морской и воздушной болезни);
- истерия;
- невроз;
- головная боль на фоне приема нитратов.

### **Относится к болезням:**

- [Воздушная болезнь](#)
- [Кардиалгия](#)
- [Кардит](#)
- [Неврит](#)
- [Неврозы](#)
- [Рвота](#)
- [Стенокардия](#)
- [Тошнота](#)

### **Противопоказания:**

— гиперчувствительность.

**Способ применения и дозы:**

Таблетки - сублингвально, по 1 таб. 2-3 раза/сут. Кратность и продолжительность приема определяется в зависимости от эффективности лечения. При отсутствии или недостаточной выраженности терапевтического эффекта в ближайшие 5-10 мин после приема необходимо назначение другой терапии.

**Побочное действие:**

Тошнота, слезотечение, головокружение.

**Особые указания и меры предосторожности:**

Следует назначать с осторожностью больным сахарным диабетом (для лекарственных форм, содержащих сахар).

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Validol-Ros>