

## Валидол С Изомальтом



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

#### **Форма выпуска, описание и состав**

◇ **Таблетки подъязычные** белого или белого с сероватыми вкраплениями цвета, круглые, плоскоцилиндрической формы, с двусторонней фаской и риской на одной стороне, с характерным запахом ментола.

	<b>1 таб.</b>
левоментола раствор в ментил изовалерате (валидол)	60 мг

Вспомогательные вещества: изомальт - 670 мг, кремния диоксид коллоидный - 12.5 мг, кальция стеарат - 7.5 мг.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.  
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.  
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные.  
20 шт. - банки стеклянные (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Оказывает седативное действие, обладает умеренным рефлекторным сосудорасширяющим действием, обусловленным раздражением чувствительных нервных окончаний. Стимулирует выработку и освобождение энкефалинов, эндорфинов и ряда других пептидов, гистамина, кининов (за счет раздражения рецепторов слизистой оболочки), которые принимают активное участие в регуляции проницаемости сосудов, формировании болевых ощущений. При сублингвальном приеме терапевтический эффект в среднем наступает через 5 мин, при этом до 70% препарата высвобождается в течение 3 мин.

### Показания к применению:

- кардиалгия;
- стенокардия;
- синдром "укачивания" (тошнота, рвота при морской и воздушной болезни);
- истерия;
- невроз;

— головная боль на фоне приема нитратов.

### **Относится к болезням:**

- [Воздушная болезнь](#)
- [Головная боль](#)
- [Кардиалгия](#)
- [Кардит](#)
- [Неврит](#)
- [Неврозы](#)
- [Рвота](#)
- [Стенокардия](#)
- [Тошнота](#)

### **Противопоказания:**

— гиперчувствительность.

### **Способ применения и дозы:**

Диагнозы

- Анемия
- Артриты
- Боли в грудной клетке
- Горная болезнь

### **Побочное действие:**

Тошнота, слезотечение, головокружение.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Следует назначать с осторожностью больным сахарным диабетом (для лекарственных форм, содержащих сахар).

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Validol\\_S\\_Izomaltom](http://drugs.thead.ru/Validol_S_Izomaltom)